3 2044 107 260 267

P
G19
1967

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received 13 Sept. 1915

Bought



TRAITÉ
DES
PLANTES ET
ANIMAUX
D'usage en Medecine, décrits
dans la Matiere Medicale de
M.R GEOFFROY MEDECIN,
Dessinés d'après Nature par
M.R DE GARSAULT,
Gravés par M.rs Defehrt,
Prevost, Duflos, Martinet
&c. Niquet Scrip.

TOME
IV.

à Paris Chez P.F. Didot le Jeune Quai des Augustins
près le pont St. Michel à St. Augustin.

1767.

Gray Herbarium
Harvard University
13 Sept. 1915

PLANCHE 467.

Populus nigra, Peuplier noir.

ON se sert des bourgeons qui contiennent les feuilles. C'est un grand arbre.

La racine est profonde en terre; le tronc est droit; le bois jaunâtre, ferme. Lorsque les boutons s'enflent *au printemps*, avant que les feuilles commencent à en sortir, ils sont alors gros comme des Capres, d'un verd jaunâtre, pleins d'un suc gluant, d'une odeur assez agréable : les feuilles sont lisses, luisantes.

L'arbre mâle porte des chatons à étamines, stériles; l'arbre femelle porte des chatons & fruits, qui sont des capsules ovales, vertes, qui contiennent des graines ovales, aigrettées : *il fleurit au printemps, avant les feuilles.*

Il vient aux lieux humides, aquatiques.

Populus alba, Peuplier blanc.

La racine se répand vers la surface de la terre; l'écorce est lisse, blanchâtre; le bois est blanc; les feuilles sont lisses en dessus, lanugineuses en dessous.

Les chatons & fruits sont semblables au précédent; il fleurit en même-temps & vient aux mêmes lieux.

VERTUS ET USAGES DES DEUX PEUPLIERS.

Les vertus sont les mêmes; le blanc est de peu d'usage.

Ils sont astringents, adouciſſants, intérieurement & extérieurement.

Le noir est la base de l'Onguent Populeum, lequel entre dans le Baume Hypnotique, l'Onguent contre la gale, Hémorrhoïdal.

PLANCHE 468.

Porrum, Poireau, B. ANN.

ON ſe ſert du bas de la plante, près la racine.

La racine eſt compoſée de pluſieurs fibres, d'où part le bas de la plante, formé par pluſieurs enveloppes l'une ſur l'autre, en maniere de tête, groſſe d'un ou deux pouces, liſſe, blanche, d'un gout plus doux que celle de l'oignon, Pl. 207.

La tige s'éleve à quatre ou cinq pieds; les feuilles ſont alternes.

Les fleurs ſont à ſix pétales, blanches, tirant ſur le pourpre pâle; il leur ſuccede des fruits triangulaires, noirs, à trois loges, remplies de graines oblongues : *elle fleurit en été.*

La plante a l'odeur de l'oignon, mais plus douce.

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS.

Elle eſt diurétique, hyſtérique, béchique.

Les graines ſont apéritives, à la doſe d'un gros dans le vin blanc.

Extérieurement elle eſt très-adouciſſante.

PLANCHE 469.

Portulacca, Pourpier, ANN.

ON ſe ſert de ſa tige, fleurs & graines.

La racine eſt garnie de quelques fibres.

Les tiges ſe couchent ſur terre, longues d'un pied, rougeâtres, liſſes, luiſantes, ſucculentes; les feuilles ſont liſſes, d'un verd plus ou moins jaunâtre, d'un gout viſqueux, un peu acide.

Les fleurs ſont à cinq pétales, jaunes; il leur ſuccede des capſules oblongues, faites en urnes, vertes, qui contiennent pluſieurs graines menues, noires : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

Portulacca ſylveſtris, Pourpier ſauvage, ANN.

Elle reſſemble à la précédente dans toutes ſes parties; ſeulement elle eſt plus petite & ſes feuilles plus vertes : elle vient aux lieux incultes.

VERTUS ET USAGES DES DEUX POURPIERS.

Leurs vertus ſont égales.

La graine eſt une *des quatre ſemences froides mineures.*

Elle eſt rafraîchiſſante, adouciſſante, antiſcorbutique, vermifuge : la doſe du ſuc eſt trois ou quatre onces, de l'extrait un gros.

Les graines entrent dans l'Electuaire de Pſyllio, le *Requies*, le Diaprun, la Confection d'Hyacinthe, la Poudre Diarrhodon, contre les vers.

PLANCHE 470.

Primula-veris, Primevere, VIV.

ON ſe ſert des feuilles & fleurs.

La racine eſt aſſez groſſe, rougeâtre, fibreuſe, d'une odeur aromatique agréable, d'un gout un peu aſtringent.

Les feuilles ſont remplies d'un duvet très-court; les pédicules des fleurs s'élevent de ſix à ſept pouces, un peu velus.

Les fleurs ſont monopétales en ſoucoupe, refendues en cinq, jaunes; il leur ſuccede des coques ovales, qui renferment pluſieurs graines menues, noires.

Toute la plante a un gout âcre, amer : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les prés & dans les bois.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt céphalique, anodine : la doſe des fleurs en infuſion, eſt une bonne pincée dans l'eau bouillante.

Extérieurement les fleurs ſont calmantes.

Elle entre dans l'Eau générale.

PLANCHE 471.

Prunus ſativa, Prunier.

ON ſe ſert de ſon fruit.

C'eſt un arbre de médiocre grandeur.

La racine eſt branchue, longue, traçante, noirâtre; le bois eſt aſſez dur, rougeâtre; l'écorce eſt gris brun; les feuilles ſont liſſes, d'un gout un peu amer, aſtringent.

Les fleurs viennent *au printemps*, avant les feuilles; elles ſont

à cinq pétales, blanches; il leur succede un fruit charnu, ou jaune, ou bleu, plus ou moins gros, succulent, nommé *Prune*, doux & très-agréable au gout; il renferme un noyau oval, dur, qui contient une amande.

Vertus et Usages.

Les Prunes sont humectantes, émollientes, laxatives; celles qu'on nomme le petit damas noir, sont préférées en Médecine. C'est communément avec cette espece qu'on fait les pruneaux.

La gomme qui se trouve sur le Prunier & sur ses fruits, a les mêmes qualités de la gomme arabique, Pl. 95.

Les Prunes entrent dans les deux Electuaires Diaprun, la Confection Hamech, le Lénitif de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 472.

Pseudo-acacia, faux Acacia.

ON se sert de ses fleurs.

C'est un grand arbre épineux.

La racine est longue, grosse, traçante, jaunâtre, d'un gout douceâtre.

Les fleurs sont légumineuses, blanches, d'une odeur douce & agréable, imitant celle de la fleur d'orange; il leur succede des gousses longuettes, applaties, partagées en deux côtes où sont renfermées des graines de la figure d'un rein: *il fleurit au printemps.*

Il vient au Canada, dans la Virginie; on le cultive dans nos pays.

Vertus.

Il est antihystérique, sur-tout les fleurs.

PLANCHE 473.

Psyllium erectum, Herbe aux puces, Ann.

ON se sert de la graine.

La racine est blanche, fibrée.

La tige s'éleve d'environ un pied, ferme, velue ainsi que les feuilles.

Les fleurs ſont monopétales en tuyau refendu en quatre, verd pâle ; il leur ſuccede une coque à deux loges, renfermant deux graines reſſemblantes à une puce : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, dans les champs.

PLANCHE 474.

Pſyllium ſupinum, petite Herbe aux puces, Viv.

LA racine eſt longue, dure, garnie de fibres.

Les tiges ſont rampantes d'abord, puis ſe relevent à la hauteur de ſix à huit pouces ; les feuilles ſont verd blanchâtre, velues ; les fleurs & fruits ſont ſemblables à la précédente : *elle fleurit au même temps.*

Elle vient dans nos pays chauds & le long de la mer.

Vertus et Usages des deux Herbes aux puces.

Leurs vertus ſont les mêmes.

On tire des graines un mucilage adouciſſant & rafraîchiſſant, intérieurement & extérieurement.

La graine entre dans l'Electuaire de Pſyllio, le *Requies*. *Son mucilage* entre dans les Trochiſques de Camphre, de Karabé, de Gordon.

PLANCHE 475.

Pulmonaria, Pulmonaire, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt blanche, fibrée, d'un gout viſqueux.

Les tiges s'élevent d'environ un pied, anguleuſes, velues, d'une couleur tirant ſur le purpurin ; les feuilles ſont garnies de duvet deſſus & deſſous, & marbrées de taches blanchâtres.

Les fleurs ſont monopétales en tuyau évaſé, découpé en cinq, ou purpurines, ou violettes ; il leur ſuccede quatre graines, preſque rondes au fond du calice, reſſemblantes à celles de la Bugloſe : *elle fleurit au printemps.*

Nota. Il ſe trouve une autre Pulmonaire, qui ne differe de la précédente que par ſes feuilles, qui ſont plus étroites & quelquefois ſans tache.

Elles viennent toutes deux aux mêmes endroits, dans les bois, aux lieux montagneux.

PLANCHE 476.

Pulmonaria Gallorum, Pulmonaire des François, Viv.

LA racine eſt groſſe, longue, rougeâtre, fibrée, remplie d'un ſuc laiteux, amer.

La tige s'éleve juſqu'à un pied & demi, velue; les feuilles ſont verdâtres, marbrées de taches noires, velues en deſſus, blanchâtres & velues deſſous, d'un gout amer.

Les fleurs ſont à demi-fleurons, jaunes; il leur ſuccede pluſieurs graines oblongues, menues, noirâtres, aigrettées: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, ſur les vieux murs.

VERTUS ET USAGES DES PULMONAIRES.

Elles ont les mêmes vertus.

Elles ſont adouciſſantes, vulnéraires, conſolidantes, béchiques: la doſe du Sirop où on emploie les racines & les feuilles, eſt une once ou deux.

Les feuilles entrent dans le Sirop de Tortue. *Toute la plante* entre dans le Sirop de Roſſolis compoſé.

PLANCHE 477.

Pulſatilla, Coquelourde, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles, fleurs & racine.

La racine eſt longue, groſſe comme le doigt, ſimple ou diviſée en pluſieurs têtes chevelues, noires, d'un gout un peu amer & âcre.

Les feuilles ſont velues, très-âcres & brûlantes.

Le pédicule de la fleur s'éleve peu d'abord; la fleur eſt à ſix pétales, purpurine, velue en dehors, d'une odeur aſſez agréable; le pédicule monte enſuite juſqu'à un pied; au deſſous du milieu de ſa hauteur eſt une feuille qui l'embraſſe; il eſt creux, couvert d'un coton épais; il ſupporte un fruit compoſé de pluſieurs graines, terminées par une longue barbe velue: *elle fleurit au printemps.*

Elle vient aux lieux arides, montagneux.

VERTUS ET USAGES.

Extérieurement elle eſt inciſive, vulnéraire, ſternutatoire; la racine eſt moins âcre que les feuilles.

Les fleurs entrent dans l'Eau hyſtérique de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 478.

Pyrola, Pyrole, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt déliée, traçante, fibreuſe, blanche.

La tige eſt haute d'environ un pied, anguleuſe; les feuilles ſont verd brun, liſſes, toujours vertes.

Les fleurs ſont à cinq pétales, blanches, odorantes; il leur ſuccede un fruit à cinq pans arrondis, diviſés en cinq loges, remplies de graines menues comme de la ſciure de bois: *elle fleurit en été.*

La plante a un gout amer, très-aſtringent.

Elle vient à l'ombre, dans les bois montagneux.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente: la doſe en infuſion eſt une pincée, & en poudre un gros.

Elle entre dans *les Vulnéraires Suiſſes. Le ſuc* entre dans l'Onguent Oppodeltoch.

PLANCHE 479.

Pyrus, Poirier.

ON ſe ſert du fruit, nommé Poire.

C'eſt un arbre aſſez grand.

La racine eſt groſſe; elle s'enfonce avant en terre.

Le tronc eſt droit, plus élevé que celui du Pommier & l'écorce plus raboteuſe; le bois ferme, rouſſeâtre; les feuilles ſont liſſes, luiſantes en deſſus, blanchâtres en deſſous.

Les fleurs ſont à cinq pétales, ſemblables à celles du Pommier, Pl. 360; il leur ſuccede un fruit oblong, plus menu vers la queue, diviſé dans le centre de ſa pulpe en cinq loges,

remplies de quelques graines nommées pepins, noirs en dehors, blancs en dedans : *il fleurit au printemps.*

On le cultive dans les Vergers; il s'en trouve quantité de variétés.

Nota. Qu'on trouve dans les forêts, un Poirier sauvage; il est plus petit en toutes ses parties que le précédent; le bois plus dur, les feuilles sanguineuses en dessous; les rameaux sont garnis d'épines dures; les fleurs ressemblent au précédent; les fruits bien plus petits, durs, d'un gout âpre.

Vertus et Usages.

Les Poires douces en général, sont humectantes, rafraîchissantes.

Le suc des Poires sauvages entre dans le Sirop de Myrte de la Pharm. de Paris.

Q.

PLANCHE 480.

Quercus, Chêne.

ON se sert de son bois, des feuilles & fruits.

La racine est très-grosse & profonde en terre.

Le tronc est gros, droit; l'écorce est épaisse, rude, rougeâtre en dedans; les feuilles sont sans poil, d'un verd obscur.

Les fleurs mâles ou stériles, sont des chatons longs, distribués par petits pelotons d'étamines; les fruits viennent à part, sur le même arbre; on les nomme *des glands;* ils sont composés d'une cupule grise, raboteuse en dessus, lisse en dedans, de laquelle s'éleve le fruit, gros comme une Olive, verd jaunâtre, qui renferme une amande blanche, composée de deux lobes, d'un gout âpre : *il fleurit au printemps.*

Cet arbre est le plus commun des forêts.

Vertus.

Il est astringent dans toutes ses parties.

PLANCHE 481.

Quinque-folium, Quintefeuille, Viv.

ON ſe ſert de la ſeconde écorce de ſa racine.

La racine eſt longue, approchant de la groſſeur du petit doigt, fibreuſe, noirâtre en dehors, rouge en dedans, d'un gout aſtringent.

Les tiges ſont rampantes, longues d'environ un pied & demi, velues, rougeâtres, prenant racine de diſtance en diſtance; les feuilles ſont verd obſcur, velues.

Les fleurs ſont à cinq pétales, jaunes; il leur ſuccede un fruit, compoſé de pluſieurs graines menues, diſpoſées en rond, enveloppées par le calice de la fleur : *elle fleurit en été.*

Elle croît preſque par-tout, dans les prés, dans les bois.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt balſamique, vulnéraire, aſtringente : la doſe de ſon extrait eſt un gros.

Extérieurement les vertus ſont les mêmes.

La racine entre dans l'Eau générale, la Thériaque. *Les feuilles* entrent dans le Baume vulnéraire.

R.

PLANCHE 482.

Ranunculus bulboſus, Bacinet des prés, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine reſſemble à un très-petit oignon, fibré en deſſous.

La tige s'éleve de plus d'un pied, velue.

Les fleurs ſont à cinq pétales, d'un beau jaune; les feuilles du calice ſe replient en bas; il ſuccede aux fleurs une tête ronde, formée par l'aſſemblage de nombre de graines pointues : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés & pâturages.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt extrêmement âcre & cauſtique.

Elle entre dans l'Emplâtre Diabotanum.

PLANCHE 483.

Ranunculus nemoroſus, Bacinet blanc, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fleurs.

La racine eſt longue, rampante, fibrée, brune en dehors, d'un gout âcre, légérement aſtringent.

La tige eſt déliée, rougeâtre, haute de neuf pouces; les feuilles ſont velues.

Les fleurs ſont à ſix pétales, ou blanches, ou purpurines; il leur ſuccede un fruit pareil à la précédente : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les bois.

VERTUS.

Elle eſt déterſive extérieurement, mais âcre & cauſtique; ce qui fait qu'il eſt dangereux de l'employer.

PLANCHE 484.

Ranunculus repens, Bacinet rampant, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fleurs.

La racine eſt rampante, compoſée de pluſieurs fibres blanchâtres.

Les tiges ſont velues, creuſes, couchées ſur terre, prenant racine de diſtance en diſtance; il s'éleve des tiges qui portent les fleurs à la même hauteur de la premiere; les feuilles ſont velues deſſus & deſſous, verd noirâtre, avec quelques taches blanches en deſſus.

Les fleurs & fruits reſſemblent à la premiere ci-deſſus.

Elle vient dans les prés & autres lieux incultes.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive, adouciſſante.

PLANCHE 485.

Ranunculus paluſtris, Grenouillette d'eau, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt groſſe, creuſe, fibrée, d'un gout fort & brûlant.

La tige s'éleve à deux pieds & plus, groſſe, cannelée, creuſe; les feuilles ſont verdâtres, luiſantes.

Les fleurs ſont petites, reſſemblantes d'ailleurs à la premiere; les fruits ſont raſſemblés en tête oblongue, formée par des graines menues, liſſes : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux aquatiques & marécageux.

VERTUS.

Elle eſt un poiſon des plus forts, priſe intérieurement.

Extérieurement elle eſt réſolutive.

PLANCHE 486.

Rapa, la vraie Rave, Turnip, *en Anglois*, B. ANN.

ON ſe ſert de la racine & graine.

La racine eſt ronde, groſſe quelquefois comme la tête, charnue, de couleurs différentes en dehors, ou verte, ou blanche, ou jaune, ou rouge, fibrée en deſſous comme l'oignon, blanche en dedans, d'un gout, ou doux, ou âcre.

La tige s'éleve de deux pieds, quelquefois beaucoup plus; les feuilles ſont rudes, verd brun, d'un gout d'herbe.

Les fleurs ſont à quatre pétales, jaunes; il leur ſuccede des gouſſes longues & étroites, partagées en deux loges, qui contiennent des graines arrondies, rougeâtres : *elle fleurit en été.*

Nota. Que celle-ci eſt nommée le mâle, pour la diſtinguer d'une autre eſpece pareille, qui n'a de différence que dans ſa racine, qui eſt allongée & plus petite, qu'on appelle la femelle.

On les cultive dans les champs, ſur-tout en Limouſin, où on la nomme la *Rabioule*. Les Anglois la nomment *Turnip*.

VERTUS.

Elle eſt adouciſſante, béchique, déterſive, en décoction.

La graine eſt alexitaire ; elle entre dans la compoſition des Antidotes.

PLANCHE 487.

Raphanus minor, Raifort, Rave des Pariſiens, B. Ann.

ON ſe ſert de ſa racine & graine.

La racine eſt groſſe du doigt, plus ou moins, charnue, de couleur rouge vif en dehors, blanche en dedans, d'un gout âcre & piquant.

La tige s'éleve de deux ou trois pieds ; les feuilles ſont rudes.

Les fleurs ſont à quatre pétales, purpurines ; il leur ſuccede des gouſſes, partagées en deux loges, remplies de graines preſque rondes, rouges : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

Vertus et Usages.

Elle eſt diurétique : la doſe du ſuc eſt trois ou quatre onces avec le miel.

La racine entre dans le Sirop de Guimauve.

PLANCHE 488.

Raphanus ruſticanus, Raifort ſauvage, Viv.

ON ſe ſert de la plante, principalement de ſa racine.

La racine eſt rampante, groſſe, longue, blanche, d'un gout âcre & brûlant.

La tige qui ſupporte les fleurs, s'éleve d'un pied & demi ; quelquefois elle vient à part des grandes feuilles, quelquefois au milieu. Les grandes feuilles ſont rudes, d'un beau verd.

Les fleurs ſont à quatre pétales, blanches ; il leur ſuccede de petits fruits ronds, partagés en deux loges, qui contiennent quelques graines arrondies, liſſes, rougeâtres : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient aux lieux humides & aquatiques ; on la cultive dans les Potagers

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt antiſcorbutique, apéritive, vermifuge, inciſive, réſolutive; on ſe ſert de ſon ſuc.

La racine entre dans la décoction antiſcorbutique, l'Eau générale, le Sirop antiſcorbutique, de Guimauve compoſé. *Les feuilles & la racine* entrent dans l'Emplâtre Diabotanum.

PLANCHE 489.

Rapunculus, Raiponſe, B. ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt groſſe du petit doigt, oblongue, blanche.

La tige s'éleve juſqu'à deux pieds, cannelée, velue; les feuilles ſont empreintes d'un ſuc laiteux.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, bleues, rarement blanches; il leur ſuccede un fruit, diviſé en trois loges, qui renferment pluſieurs graines rouſſeâtres, luiſantes: *elle fleurit en été.*

Toute la plante donne du lait.

Elle vient dans les champs, dans les prés.

PLANCHE 490.

Rapunculus ſpicatus, Raiponſe ſauvage, VIV.

LA racine eſt pareille en tout à la précédente.

La tige s'éleve à un pied & demi, anguleuſe, creuſe, laiteuſe.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en cinq lanieres, blanches ou bleues, ou purpurines; il leur ſuccede de petits fruits arrondis, pareils aux précédents: *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les prés bas & parmi les broſſailles.

VERTUS DES DEUX RAIPONSES.

On préfere la premiere; elles ſont apéritives, ſtomachiques.

PLANCHE 491.

Reseda, Reseda, Viv.

ON se sert de la plante.

La racine est longue, dure, blanche, d'un gout âcre.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, velues, cannelées, creuses; les feuilles sont verd brun, d'un gout d'herbe.

Les fleurs sont à six pétales irréguliers, jaunâtres; il leur succede des capsules vertes à trois angles, remplies de semences menues, noires: *elle fleurit en été.*

Toute la plante est fort amere.

Elle vient dans les champs, le long des chemins.

VERTUS.

Extérieurement elle est adouciſſante & résolutive.

PLANCHE 492.

Rhamnus catharticus, Nerprun, Bourg-épine.

ON se sert de ses fruits ou baies.

C'est un arbrisseau épineux.

La racine est longue & mince; le bois est jaunâtre; l'écorce ressemble à celle du Noyer, Pl. 312; les feuilles sont verd foncé, d'un gout astringent.

Les fleurs sont monopétales en entonnoir découpé en quatre, jaunâtres; il leur succede des baies molles, grosses comme celles du Genevrier, Pl. 88, noires, pleines d'un suc verd noir, un peu amer, contenant quelques graines noirâtres: *il fleurit au printemps.*

Il vient dans les bois & broussailles.

VERTUS.

Les baies sont purgatives, hydragogues: la dose en poudre est un gros & demi; en décoction quinze ou vingt baies; l'extrait depuis demi-once jusqu'à six gros; le Sirop depuis une once jusqu'à deux.

PLANCHE 493.

Rhus folio ulmi, Sumach.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fruits.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt rampante, longue.

Les fleurs ſont à pluſieurs pétales, d'un blanc jaunâtre; il leur ſuccede une capſule plate, verdâtre, qui contient une graine arrondie, rougeâtre; le fruit a le gout acide, fort aſtringent: *il fleurit en été.*

Il vient aux lieux ſecs & pierreux, aux environs de Montpellier; on le cultive dans les Jardins de Botanique.

Rhus Virginiana, Sumach de Virginie.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt rampante, ſe diviſant çà & là en pluſieurs branches; les pouſſes ou rameaux tendres de l'année ſont garnies d'un velouté épais, comme le bois du Cerf quand il eſt encore garni de ſa peau, Pl. 707. Elles ſont empreintes d'un lait clair.

Les épis des fleurs ſont pareillement veloutés.

Les fleurs ſont à pluſieurs pétales, rougeâtres; il leur ſuccede des fruits très-rouges, qui contiennent une graine applatie, noirâtre, d'un gout aigrelet: *il fleurit en été.*

Il vient en Amérique; on le cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus et Usages des deux Sumachs.

Elles ſont les mêmes.

Ils ſont aſtringents, rafraîchiſſants, antiſcorbutiques: la doſe des fruits eſt une grappe dans une pinte d'eau froide. L'extrait ſe donne à la doſe de deux gros ou demi-once.

PLANCHE 494.

Rosa pallida, Rose pâle.

ON se sert de ses fleurs.

C'est un sous-arbrisseau.

La racine est longue, dure.

Les tiges & les branches sont garnies d'épines, dures & piquantes, attachées à une écorce d'un verd obscur; les feuilles sont du même verd.

Les fleurs sont formées quelquefois par cinq pétales, mais plus souvent par des pétales sans nombre, d'une belle couleur de chair, d'une odeur très-agréable; il leur succede un fruit de la grosseur & figure d'une petite Olive, rouge, qui contient plusieurs graines anguleuses, blanchâtres, velues: *il fleurit au printemps.* On nomme le fruit *Gratecul.*

On la cultive dans les Jardins.

Vertus et Usages.

L'eau qu'on tire des fleurs est purgative, céphalique, cordiale: la dose est depuis une once jusqu'à six.

Extérieurement elle est vulnéraire, détersive, astringente.

Elle entre dans l'Electuaire Diaphœnic, le Diaprun, l'Onguent Rosat. *Le suc* entre dans l'Emplâtre de l'Abbé de Grace. *Le Sirop simple* dans les Pilules d'Agaric, impériales, le Sirop composé dans les Pilules angéliques. *L'Eau distillée & l'Esprit ardent* dans l'Eau de mille-fleurs.

Rosa alba, Rose blanche.

La racine ressemble à la précédente.

Les tiges s'élevent davantage & jusqu'à huit ou dix pieds, garnies d'épines assez clair semées.

Les fleurs sont à cinq pétales blancs, souvent davantage, moins odorantes que la premiere; les fruits lui ressemblent: *elle fleurit au printemps.*

On la cultive dans les Jardins.

Vertus.

Elle n'est point purgative; elle est ophthalmique, astringente, extérieurement.

PLANCHE

PLANCHE 495.

Rosa moschata, Rose muscate.

ON se sert de ses fleurs.

La racine ressemble aux précédentes.

Les tiges montent aussi haut que celles de la Rose blanche, garnies d'épines clair semées, rougeâtres & fortes; les feuilles sont vertes en dessus, blanchâtres en dessous.

Les fleurs sont à cinq pétales blancs, d'une odeur très-agréable, tirant sur le musc, d'un gout amer, un peu astringent; les fruits comme aux précédentes : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins.

Vertus et Usages.

Elle a à peu près les vertus de la Rose pâle; mais elle est beaucoup plus purgative : la dose est une ou deux pincées dans un bouillon au veau.

Elle entre dans les Pilules Angéliques, dans l'Eau de mille-fleurs.

Rosa Provincialis, Rose de Provins.

La racine est traçante, forte, ligneuse.

Les tiges sont moins hautes que dans les especes précédentes; elle est revêtue d'une écorce plus verte, garnie d'épines; les feuilles sont de la même couleur que la précédente.

Les fleurs sont simples ou doubles comme les autres, d'une belle couleur, rouge foncé, veloutée, d'une odeur foible, mais douce & agréable; les fruits comme aux autres.

On la cultive dans les Jardins, aux environs de la ville de Provins.

Vertus et Usages.

Elle est astringente, détersive, stomachale; on l'emploie en Sirop, Teinture, Conserve, &c.

Extérieurement elle est astringente, résolutive, fortifiante.

Elle entre dans la Thériaque, le Diascordium, la Confection d'Hyacinthe, la Poudre Diarrhodon, les Trochisques de Camphre.

PLANCHE 496.

Rosa sylvestris Cynorrhodos, Eglantier.

ON se sert de sa racine, fleurs & graines.
C'est un sous-arbrisseau.

La racine est longue, traçante, dure.

Les tiges s'élevent jusqu'à dix pieds & plus, armées de grandes épines.

Les fleurs sont toujours simples à cinq pétales blancs un peu couleur de chair, odorantes; les fruits sont gros comme des glands, d'un rouge couleur de corail; leur écorce est charnue, d'un gout doux, agréable & acide; ils contiennent nombre de graines oblongues, blanches, anguleuses, dures, enveloppées dans un poil ferme. Ce fruit a aussi le nom de *Grattecul: il fleurit en été.*

Il se forme souvent sur ses tiges une grosseur couverte de longs filets velus, roux, pressés l'un contre l'autre, donnant l'idée d'une éponge, grosse quelquefois comme une pomme d'api; elle est occasionnée par la piquure d'un insecte, qui y dépose ses œufs, que la seve s'extravasant enveloppe, se durcit & forme cette grosseur dans laquelle on trouve, en l'ouvrant, ou ces œufs, ou les moucherons qui en proviennent. On lui a donné le nom d'éponge d'Eglantier ou *Bedéguar.*

Il vient dans les bois, dans les haies.

Vertus et Usages.

Les fleurs sont purgatives; les graines sont apéritives, astringentes; les fruits sont adouciſſants, astringents; l'éponge a les mêmes vertus: les doses en infusion sont depuis deux gros jusqu'à demi-once; la décoction est plus déterſive qu'astringente; la racine s'emploie contre la rage.

La Conserve entre dans les Pilules d'Ancholie.

PLANCHE 497.

Rosmarinus, Romarin.

ON se sert de toutes ses parties.

C'est un sous-arbrisseau.

La racine est ligneuse, fibreuse, brune en dehors, blanche en dedans.

La tige s'éleve à trois ou quatre pieds ; les feuilles sont verd brun en dessus, blanches en dessous, d'une odeur aromatique forte & agréable, d'un gout âcre.

Les fleurs sont en gueule, bleu pâle, d'une odeur plus douce que les feuilles ; il leur succede quatre graines, presque rondes au fond du calice : *il fleurit au printemps.*

Il vient dans nos pays chauds ; on le cultive dans les Jardins.

Vertus et Usages.

Il est céphalique, apéritif, désobstruant, hystérique, cordial, en infusion dans le vin.

Extérieurement il est nervin, fortifiant.

Les fleurs entrent dans le Sirop de Stœchas, d'Eryſimum composé, l'Onguent Oppodeltoch. *Les sommites* entrent dans l'Orviétan. *La Conserve* dans l'Opiat de Salomon.

PLANCHE 498.

Rossolis, Rossolis, Viv.

ON se sert de la plante.

La racine est composée de fibres Capillaires.

Les feuilles sont presque rondes, creusées en cuilleron par dessus, convexes en dessous, verd pâle, bordées de longs poils, au bout de chacun desquels est toujours une goutte de liqueur transparente, grosse comme une tête d'épingle.

Les pédicules des fleurs s'élevent de quatre pouces, rougeâtres ; les fleurs sont à cinq pétales, blanchâtres ; il leur succede un fruit, gros comme un grain de bled, qui contient plusieurs petites graines : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux marécageux, aquatiques.

Toute la plante eſt gluante au toucher.

Nota. Qu'il s'en trouve une autre eſpece, qui ne differe de celle-ci que par les feuilles, qui ſont allongées, reſſemblantes à une ſpatule concave.

VERTUS.

Elle eſt pectorale : la doſe en infuſion eſt juſqu'à deux gros, en poudre un gros.

PLANCHE 499.

Rubeola, Rougeolle, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt longue, branchue, fibrée, profonde en terre, noirâtre.

Les tiges ſont couchées ſur terre, longues d'environ un demi-pied, anguleuſes ; les feuilles ſont luiſantes.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir, refendues en quatre, blanches ou rougeâtres, ſentant un peu le Jaſmin ; il leur ſuccede des graines deux à deux, oblongues, rudes, jaunâtres : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux arides, montagneux.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt aſtringente, mais de peu d'uſage.

PLANCHE 500.

Rubia tinctorum, Garance, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt groſſe comme un tuyau de plume, branchue, longue, rampante, ſucculente, rouge en dehors & en dedans, d'un gout doux-amer, aſtringent.

Les tiges ſont ſarmenteuſes, quarrées, rudes, longues de trois pieds ; les feuilles ſont rudes, hériſſées de poils.

Les fleurs ſont monopétales en godet, découpé en cinq, d'un jaune verdâtre ; il leur ſuccede un fruit, compoſé de deux baies jointes enſemble, noires, qui contiennent chacune une graine ronde : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les champs, pour la teinture en rouge.

VERTUS.

Elle eſt une *des cinq racines apéritives mineures.*

Elle eſt apéritive, hépatique, ſplénique, hyſtérique, diurétique : la doſe des racines fraîches eſt de demi-once à une once, & ſeches d'un gros à deux gros.

PLANCHE 501.

Rubus, Ronce.

ON ſe ſert de toutes ſes parties.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt menue, ſerpentante.

Les tiges ou branches ſont très-longues, pliantes, les unes s'élevant, d'autres ſerpentant à terre, anguleuſes, moëlleuſes, s'enracinant de diſtance en diſtance, garnies d'épines crochues, très-piquantes; les feuilles ſont verd foncé en deſſus, blanchâtres en deſſous, d'un gout aſtringent; il s'en trouve qui reſtent vertes tout l'hiver.

Les fleurs ſont à cinq pétales, rougeâtres; il leur ſuccede des fruits ronds ou ovales, compoſés de nombre de petites baies ſucculentes, imitant le fruit du Mûrier noir, Pl. 390. Elles deviennent noires, d'un gout doux aſſez agréable; elles contiennent une graine oblongue : *il fleurit en été.*

Il vient par-tout, aux lieux incultes, bois, buiſſons ou plaines.

VERTUS ET USAGES.

La ronce eſt aſtringente, déterſive, abſorbante; les fruits ſont rafraîchiſſants.

Extérieurement les feuilles ſont vulnéraires, déterſives.

Les ſommités entrent dans l'Onguent Populeum; les fruits entrent dans le Diamorum ſimple & compoſé.

PLANCHE 502.

Rubus idæus, Framboiſier.

ON ſe ſert de ſes fruits, feuilles & ſommités.
C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt longue, ſerpentante, branchue.

Les tiges s'élevent à cinq pieds & plus, vertes, moëlleuſes, garnies de petites épines; les feuilles ſont verd brun en deſſus, blanchâtres en deſſous, d'un gout auſtere.

Les fleurs ſont à cinq pétales blancs, penchées en deſſous; il leur ſuccede des fruits nommés Framboiſes, compoſés de petites baies ſucculentes, reſſemblants au précédent, rouges, quelquefois blancs, d'une odeur agréable, d'un gout doux & vineux. Chaque baie renferme une graine blanche : *il fleurit en été.*

Il vient aux lieux humides & ombrageux; on le cultive dans les Potagers.

VERTUS.

La Framboiſe eſt humectante, rafraîchiſſante, cordiale, ſtomachale, apéritive, antiſcorbutique.

Extérieurement les ſommités ſont déterſives, aſtringentes.

PLANCHE 503.

Ruſcus alexandrinus, Laurier alexandrin, VIV.

ON ſe ſert de ſes racines & feuilles.
La racine eſt longue, dure, fibreuſe, blanche.

Les tiges s'élevent de deux pieds, vertes; les feuilles ſont d'un beau verd.

Au milieu de la plupart des feuilles ſur la principale nervure, il s'éleve une petite feuille, à l'origine de laquelle paroît une très-petite fleur en grelot, d'un jaune verdâtre preſque imperceptible; il lui ſuccede une baie ronde, menue, rouge, qui contient une ou deux graines dures comme de la corne : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux montagneux.

VERTUS.

La racine eſt apéritive, diurétique, hyſtérique : la doſe en tiſane ou en décoction dans le vin, eſt une once par pinte ; la poudre des feuilles & racines eſt depuis un gros juſqu'à deux.

Extérieurement les feuilles ſont vulnéraires, aſtringentes.

PLANCHE 504.

Ruſcus, Houx-frêlon, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine, feuilles & fruits.

La racine eſt groſſe, raboteuſe, tortue, dure, traçante, garnie de groſſes fibres blanches, d'un gout âcre, un peu amer.

Les tiges s'élevent de deux pieds, cannelées ; les feuilles ſont roides, piquantes par le bout, toujours vertes, d'un gout amer, aſtringent.

Les fleurs naiſſent au milieu des feuilles comme la précédente ; mais bien plus grandes, monopétales à ſix découpures, jaunâtres ; il leur ſuccede des baies rondes, groſſes comme un pois, un peu molles, rouges, d'un gout douceâtre, qui contiennent une ou deux graines, dures comme de la corne : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les bois, aux lieux pierreux.

VERTUS ET USAGES.

La racine eſt une *des cinq racines apéritives majeures ;* elle eſt diſcuſſive, réſolutive : la doſe dans les décoctions eſt d'une demi-once à une once.

La racine entre dans le Sirop des cinq racines apéritives. *Les graines* dans la Bénédicte laxative.

PLANCHE 505.

Ruta, Rue, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & ſommités.

La racine eſt dure, fibreuſe, jaune.

Les tiges s'élevent juſqu'à cinq pieds, ligneuſes, couvertes

d'une écorce blanche; les feuilles ſont liſſes, verd de mer.

Les fleurs ſont à quatre pétales, jaune pâle; il leur ſuccede un fruit à quatre loges, qui contiennent pluſieurs ſemences en forme de rein : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur forte & un gout âcre & amer.

Elle reſte verte toute l'année.

On la cultive dans les Jardins.

Nota. Qu'il y a une autre eſpece *de Rue*, qui eſt ſauvage; elle reſſemble preſque en tout à celle-ci; les différences ſont qu'elle eſt plus petite, & que les découpures des feuilles ſont allongées & étroites, d'un verd plus obſcur, d'une odeur plus forte & d'un gout plus âcre. On lui préfere la cultivée ci-deſſus.

Vertus et Usages.

Elle eſt inciſive, atténuante, diſcuſſive, hyſtérique, vermifuge, alexitaire : la doſe des feuilles & graines en infuſion & en décoction, eſt une ou deux pincées de feuilles fraîches & un gros en poudre.

Extérieurement elle eſt déterſive.

Les feuilles entrent dans l'Eau Prophylactique, Hyſtérique, l'Electuaire de baies de Laurier, le Diaphœnic, l'Orviéran, la Poudre contre la rage, les Trochiſques de Myrrhe, l'Onguent Martiatum. *Les ſommités* entrent dans l'Eau Thériacale, le Baume tranquille. *Les graines* dans le Sirop de Stœchas, d'Armoiſe, la Poudre d'acier, les Pilules fœtides. *Le ſuc* entre dans les Trochiſques hyſtériques.

S.

PLANCHE 506.

Sabina foliis tamariſci, Sabine à feuilles de tamaris, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles, écorce & bois.

La racine eſt ligneuſe.

La plante s'éleve à trois pieds; elle eſt verte toute l'année; les feuilles ont une odeur déſagréable, un gout âcre & brûlant; elles imitent celles du Tamaris, Pl. 577.

Les fleurs ſont de petits chatons à étamines, verdâtres, ſtéri-

les; les fruits ſont inconnus dans nos climats : *elle fleurit au printemps.*

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

Sabina foliis cupreſſi, Sabine à feuilles de Cyprès, Viv.

On ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt comme la précédente.

La plante s'éleve un peu plus que la précédente; elle eſt de même verte toute l'année ; les feuilles imitent celles du Cyprès, Pl. 240, d'une odeur forte & pénétrante, d'un gout amer, aromatique, réſineux.

Les fleurs ſont à trois pétales, d'un verd jaune; il leur ſuccede des baies chârnues, d'un blanc gris, arrondies en Olive, contenant trois oſſelets oblongs : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient aux lieux incultes, ſur les montagnes, dans les bois; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

Vertus et Usages des deux Sabines.

La premiere eſpece eſt la plus employée.

Elle eſt inciſive, pénétrante, apéritive, hyſtérique : la doſe en infuſion eſt juſqu'à demi-once, & en poudre juſqu'à un gros.

Extérieurement elle eſt déterſive, réſolutive.

Les feuilles entrent dans l'Eau hyſtérique, les Trochiſques hyſtériques, le Sirop d'Armoiſe, l'Onguent Martiatum. *Les ſommités* entrent dans le Sirop d'acier. *L'Huile diſtillée* dans le Baume & l'eſſence hyſtérique.

Nota. Que ſa vertu hyſtérique eſt très-dangereuſe; car mal adminiſtrée elle peut cauſer l'avortement, ſuivi d'hémorrhagie & de la mort.

PLANCHE 507.

Salicaria, Salicaire, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt groſſe du doigt, dure, blanche.

Les tiges s'élevent de quatre à cinq pieds, rougeâtres, anguleuſes; les feuilles ont un gout aſtringent.

Les fleurs ſont à ſix pétales pourpres; il leur ſuccede des capſules oblongues, pointues, partagées en deux loges, qui contiennent nombre de graines menues : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux aquatiques, dans les prés.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente, rafraîchiſſante; cependant elle eſt peu en uſage.

PLANCHE 508.

Salix, Saule.

ON ſe ſert de ſon écorce, feuilles & chatons.
C'eſt un grand arbre.

La racine eſt longue, dure, blanche.

L'écorce eſt unie, blanche; le bois eſt blanc; les feuilles ſont velues, blanchâtres, ſur-tout en deſſous.

Le mâle ne porte que des chatons longs, garnis d'étamines deux à deux.

La femelle porte des chatons ſans étamines, qui deviennent des capſules pointues, à deux loges, remplies de petites graines ovales, aigrettées: *il fleurit au printemps.*

Il vient aux lieux humides, ſur le bord des eaux.

PLANCHE 509.

Salix caprea, Marſeau.

LA racine eſt ſemblable à celle du précédent.
C'eſt un arbriſſeau.

L'écorce en eſt blanchâtre, un peu amere; les feuilles ſont verd foncé en deſſus, un peu velues & blanchâtres en deſſous, d'un gout aſtringent; le mâle & la femelle ſont des pieds ſéparés comme au précédent; les chatons de l'un & de l'autre viennent *au printemps*, avant les feuilles. Ils ſont plus gros & ramaſſés que ceux du Saule ci-deſſus & cotonneux.

Il vient aux mêmes lieux.

VERTUS DES DEUX SAULES.

Elles ſont les mêmes.

Le Saule eſt rafraîchiſſant, aſtringent.

PLANCHE 510.

Salvia major, grande Sauge, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fleurs.

La racine eſt dure, fibreuſe.

Les tiges s'élevent de deux pieds, velues, verd blanchâtre; les feuilles ſont blanchâtres, cotonneuſes, d'une odeur forte, agréable, d'un gout aromatique, amer, un peu âcre.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, bleu pourpre, peu odorantes; il leur ſuccede quatre graines arrondies, noirâtres au fond du calice: *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins.

Salvia Hiſpanica, Sauge d'Eſpagne, Viv.

La grande Sauge d'Eſpagne reſſemble à la précédente; ſes fleurs ſont blanches.

PLANCHE 511.

Salvia minor, petite Sauge, Viv.

LA racine reſſemble à celle de la grande Sauge.

Les tiges ſont blanchâtres, lanugineuſes, hautes d'un pied & plus; les feuilles ſont petites, blanches, quelques-unes ſont accompagnées à leur baſe d'une ou deux petites oreillettes, d'une odeur aromatique, pénétrante, plus forte que la grande Sauge: *elle fleurit en été.*

Les fleurs & fruits lui ſont ſemblables en tout.

On la cultive dans les Jardins; on la préfere à toutes les Sauges ci deſſus.

Vertus et Usages des Sauges.

Elles ſont céphaliques, diurétiques, ſtomachales, carminatives, pectorales, vermifuges.

Extérieurement elles ſont vulnéraires, déterſives, fortifiantes.

Elles entrent dans l'Orviétan, la Poudre contre la rage. *Les ſommités fleuries* entrent dans l'Eau Thériacale, le Baume tranquille, l'Onguent Martiatum, contre la brûlure. *Les fleurs* entrent dans l'Eau impériale, le Sirop de Stœchas, le Baume Oppodeltoch.

PLANCHE 512.

Sambucus, Sureau.

ON ſe ſert de toutes ſes parties.

C'eſt un arbriſſeau de moyenne hauteur.

La racine eſt ligneuſe, longue, blanchâtre.

Le tronc eſt couvert d'une écorce cendrée, rude; la ſeconde écorce eſt verte; le bois eſt jaunâtre; les rameaux ſont remplis de moëlle blanche; les feuilles ont une odeur forte.

Les fleurs imitent le paraſol; elles ſont monopétales, découpées en ſix, blanches, très-odorantes; il leur ſuccede des baies, groſſes comme celles de Genievre, Pl. 88, noires, pleines d'un ſuc rouge foncé, qui contient trois ou quatre graines anguleuſes: *il fleurit en été.*

Il vient preſque par-tout, aux lieux humides, dans les haies.

VERTUS ET USAGES.

L'écorce moyenne & les boutons ou jeunes feuilles, ſont un doux purgatif Hydragogue, ainſi que les *fleurs fraîches*. *Les fleurs ſeches* ſont diaphorétiques; ſes pepins ou graines ſont purgatifs; leur doſe eſt trois gros ou demi-once en poudre, & en émulſion environ une once. *Les baies* ſont rafraîchiſſantes, aſtringentes.

Extérieurement l'huile des graines eſt adouciſſante, réſolutive ainſi que les feuilles. *Les fleurs* ſont réſolutives, anodines, adouciſſantes. *La ſeconde écorce* guérit les brûlures.

Les fleurs entrent dans la décoction aromatique, l'Eau générale, le Baume tranquille. *Les feuilles* dans l'Onguent Martiatum. *Les baies* dans l'Eau hyſtérique de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 513.

Samolus, Mouron d'eau, B. ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt blanche, garnie de fibres Capillaires.

La tige s'éleve d'environ un pied; les feuilles ſont verd pâle.

Les fleurs ſont monopétales, blanches, découpées en cinq; il leur ſuccede des capſules ovales, qui contiennent des graines menues, rouſſeâtres.

La plante a un gout amer: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux aquatiques & marécageux.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, apéritive, déterſive, antiſcorbutique; mais elle eſt de peu d'uſage.

PLANCHE 514.

Sanicula, Sanicle, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt aſſez groſſe en haut, fibreuſe en bas, noirâtre en dehors, blanche en dedans, d'un gout amer.

La tige s'éleve d'environ un pied, liſſe; les feuilles ſont luiſantes, liſſes, vertes toute l'année.

Les fleurs ſont à cinq pétales, blanches ou rouges, par bouquets; il ſe trouve dans un même bouquet des fleurs ſtériles & d'autres ſans étamines, qui deviennent des fruits ronds, compoſés de deux graines jointes enſemble, hériſſées de pointes crochues : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt aſtringente, déterſive, vulnéraire, conſolidante : la doſe en infuſion, comme le Thé, eſt une pincée; ſon ſuc eſt deux ou trois onces.

Elle entre dans l'Eau vulnéraire. *Les feuilles* entrent dans le Baume vulnéraire, le Baume Oppodeltoch. *Le ſuc* dans l'Emplâtre Oppodeltoch.

PLANCHE 515.

Sanicula aſtrantia, Sanicle de Montagne, VIV.

ON ſe ſert de ſes fleurs.

La racine eſt noire, très-fibreuſe.

La tige s'éleve d'un pied & demi, cannelée, d'un gout aromatique; les feuilles ſont verd noirâtre en deſſus, jaunâtres en deſſous, rudes.

Les fleurs ſont ramaſſées dans une couronne de feuilles, pourpre très-clair; elles ſont à cinq pétales; il leur ſuccede un fruit

oblong, composé de deux graines jointes ensemble, cannelées : *elle fleurit en été.*

Elle reste verte toute l'année.

Elle vient dans les bois, sur les montagnes.

VERTUS.

Les fleurs entrent dans *les Vulnéraires de Suisse.*

PLANCHE 516.

Saponaria, Savoniere, VIV.

ON se sert de ses feuilles.

La racine est longue, rougeâtre, rampante, fibrée.

La tige s'éleve d'un pied & demi & plus, lisse, rougeâtre, moëlleuse ; les feuilles sont lisses, d'un gout nitreux.

Les fleurs sont à cinq pétales, sortants d'un long calice, ou pourpre, ou rouge pâle, ou blanches ; il leur succede un fruit taillé en cône, plein de graines menues, rondes, rougeâtres : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides, dans les bois ; on la cultive dans les Parterres.

VERTUS ET USAGES.

Elle est apéritive, résolutive, astringente, intérieurement & extérieurement.

Elle entre dans l'Huile d'Euphorbe de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 517.

Satureia, Sariette, ANN.

ON se sert de la plante.

La racine est petite & dure.

Les tiges s'élevent d'un pied ; les feuilles ont une odeur tirant sur celle du Thim, d'un gout piquant, un peu âcre, assez agréable.

Les fleurs sont monopétales en gueule, d'un blanc pourpre ; il leur succede quatre graines menues, arrondies, au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux environs de Montpellier ; on la cultive dans les Potagers.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive, inciſive, fortifiante, pectorale.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

Les feuilles entrent dans l'Eau générale. *Les ſommités* dans l'Eau impériale de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 518.

Satureia ſpicata, Herbe de S. Julien, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt ligneuſe.

La tige & rameaux s'élevent d'un demi-pied, ligneuſes; les feuilles ſont odorantes, d'un gout âcre.

Les fleurs & graines ſont ſemblables à celles du Thim, Pl. 588, d'une couleur blanchâtre, tirant ſur le pourpre: *elle fleurit en été.*

Elle vient ſur la montagne S. Julien en Toſcane, en Sicile & ailleurs dans nos Pays chauds.

VERTUS.

Elle eſt céphalique, carminative, apéritive, hyſtérique, pectorale.

PLANCHE 519.

Saxifraga alba, Saxifrage blanche, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt compoſée de pluſieurs fibres, au bout deſquelles ſont attachés de petits tubercules, gros à peu près comme des graines de Coriandre, d'un blanc mêlé de purpurin, d'un gout tirant ſur l'amer. C'eſt ces petits tubercules qu'on nomme abuſivement, *ſemence de Saxifrage.*

La tige s'éleve à environ un pied de haut, velue; les feuilles ſont velues, verd clair.

Les fleurs ſont à cinq pétales, blanches; il leur ſuccede un fruit à deux cornes, oblong & à une ſeule loge, qui contient pluſieurs graines menues, oblongues, rouſſeâtres: *elle fleurit au printemps.*

Elle vient aux lieux incultes & dans les bois.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive & diurétique.

Elle entre dans l'Eau générale. *Toute la plante* entre dans le Sirop de Guimauve.

PLANCHE 520.

Saxifraga verna, petite Saxifrage rouge, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

Les tiges s'élevent de quatre à cinq pouces, rougeâtres; les feuilles ſont velues, gluantes, verd pâle.

Les fleurs ſont à cinq pétales, blanches; il leur ſuccede des capſules à deux cornes arrondies, contenant des graines jaunâtres, très-menues : *elle fleurit au printemps.*

Toute la plante eſt gluante.

VERTUS.

Elle eſt adouciſſante, réſolutive, déterſive, en infuſion, dans le vin.

Saxifraga aurea, Saxifrage dorée, VIV.

On ſe ſert de la plante.

La racine eſt longue, rampante, garnie de fibres capillaires.

Les tiges s'élevent de quatre à cinq pouces, anguleuſes; les feuilles ſont un peu velues, ſucculentes, d'un gout un peu amer, aſtringent.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en quatre, d'un jaune doré; il leur ſuccede des capſules à deux cornes, qui renferment des graines menues, rouge brun : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient aux lieux humides, aquatiques, à l'ombre.

VERTUS.

Ses vertus ſont pareilles à celle de l'Hépatique commune, Pl. 300.

PLANCHE 521.

Saxifraga magna, grande Saxifrage, Viv.

ON se sert de toute la plante.

La racine est grosse comme le doigt, longue, chevelue vers le haut, brune en dehors, blanche en dedans, un peu âcre.

La tige s'éleve à trois pieds & plus, cannelée, lisse, moëlleuse; les feuilles sont lisses, verd foncé, d'un gout âcre.

Les fleurs sont en parasol, d'un blanc jaunâtre; il leur succede deux graines accollées, cannelées, courtes, d'une odeur agréable, d'un gout aromatique, vineux: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés bas.

Vertus et Usages.

La racine est diurétique, carminative.

La dose de toute la plante en décoction ou son suc, est de deux à trois onces.

La graine entre dans la Bénédicte laxative.

PLANCHE 522.

Saxifraga, *Tragoselinum majus*, grand Boucage, Viv.

ON se sert de la racine, quelquefois des fleurs & graines.

La racine est grosse du petit doigt, longue, fibrée, blanche, d'un gout aromatique.

La tige s'éleve de deux pieds, cannelée, creuse; les feuilles sont lisses dessus, d'un verd noirâtre, luisant, d'un gout bien moins fort que la racine.

Les fleurs sont en parasol, blanches; il leur succede deux graines accollées, cannelées, d'un gout âcre: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, sablonneux.

PLANCHE 523.

Saxifraga, Tragoſelinum minus, petit Boucage, Viv.

LA racine eſt blanche, profonde en terre.

La tige s'éleve à un pied & demi, cotonneuſe, cannelée, creuſe; les feuilles ſont verd brun deſſus, pâle deſſous.

Les fleurs & graines comme à la précédente: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux mêmes lieux.

VERTUS ET USAGES DES DEUX BOUCAGES.

Elles ſont diurétiques, ſudorifiques, vulnéraires, déterſives, hyſtériques.

Les racines entrent dans l'Eau générale, la Poudre d'Arum compoſée. *Les feuilles* dans le Sirop de grande Conſoude, de Guimauve. *Les ſommités* dans la Poudre d'acier.

PLANCHE 524.

Scabioſa vulgaris, Scabieuſe, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt longue, droite en terre.

La tige s'éleve de deux à trois pieds, velue, creuſe; les feuilles ſont lanugineuſes, d'un gout un peu âcre.

Les fleurs forment une tête à fleurons inégaux; les plus grands au pourtour, d'un bleu tendre; il leur ſuccede des capſules oblongues, qui contiennent une graine de même: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bleds, dans les prés.

PLANCHE 525.

Scabioſa vel ſucciſa, Mords du diable, Viv.

LA racine eſt preſque groſſe du petit doigt, courte, paroiſſant comme rongée à ſa partie inférieure, garnie de longues fibres.

La tige s'éleve de deux pieds; les feuilles ſont légérement velues, plus vertes en deſſus qu'en deſſous.

Les fleurs reſſemblent à celles de la précédente; mais elles ſont plus ramaſſées & d'un bleu plus foncé, ſuivies de pluſieurs graines oblongues : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, dans les pâtures, dans les bois.

VERTUS ET USAGES DES DEUX SCABIEUSES.

Elles ſont les mêmes.

Elle eſt alexitaire, apéritive, déterſive, vulnéraire : la doſe du ſuc ou de la décoction, eſt depuis trois onces juſqu'à ſix.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

Les feuilles entrent dans le Sirop de grande Conſoude, l'Eau de lait alexitaire. *L'Eau diſtillée* entre dans les Tablettes de Guimauve. *Le ſuc* dans l'Onguent contre la gale.

PLANCHE 526.

Scandix, Peigne de Vénus, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt blanche, fibreuſe, un peu âcre.

Les tiges s'élevent d'environ un pied, velues, un peu cannelées; les feuilles ont un gout douceâtre, un peu âcre.

Les fleurs ſont en paraſol, blanches; il leur ſuccede des fruits compoſés de deux graines accollées, très-longues, ſillonnées : *elle fleurit en été.*

Elle vient parmi les bleds.

VERTUS.

Elle eſt apéritive, vulnéraire, réſolutive; elle eſt très-peu en uſage.

PLANCHE 527.

Scilla rubra, grande Squille, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine ou oignon.

La racine eſt une bulbe ou oignon, gros comme la tête d'un enfant, formé par pluſieurs enveloppes rougeâtres, ſuccu-

lentes, visqueuses & sous lequel est la vraie racine, composée de plusieurs grosses fibres.

La tige à fleurs vient avant les feuilles ; elle s'éleve de quatre à cinq pieds, droite ; les feuilles paroissent quand cette tige est tout à fait fanée ; elles sont grandes, d'un verd très-foncé.

Les fleurs sont à six pétales, rouges ; il leur succede des fruits relevés de trois coins, divisés en trois loges, qui renferment plusieurs semences arrondies, noires : *elle fleurit en automne.*

Nota. Il se trouve une autre Squille, qui ne differe de celle-ci que par la couleur de ses fleurs, qui sont blanches.

La Squille rouge & blanche viennent proche la mer, en Espagne, en Portugal, en Sicile.

PLANCHE 528.

Scilla parva, petite Squille, Viv.

ON se sert de son oignon.

La racine est composée de grosses fibres, surmontées d'un oignon plus petit que celui de la précédente & oblong, noirâtre en dehors, blanc en dedans, formé par des enveloppes pleines d'une humeur visqueuse, amere.

La tige s'éleve d'un pied, lisse ; les feuilles sont verd de mer.

Les fleurs sont à six pétales blancs, imitant la fleur du Narcisse ; les fruits sont triangulaires, divisés en trois loges, qui contiennent des graines anguleuses, noires : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient sur les bords de la mer, vers Montpellier.

Vertus et Usages des deux Squilles.

La grande & la petite ont les mêmes vertus, mais plus foibles dans la petite.

Elle est incisive, atténuante, détersive, apéritive, pectorale : la dose en poudre est de huit à douze grains.

Le suc entre dans le grand Diachilum. *Les Trochisques* dans la Thériaque. *Le vinaigre* dans l'Emplâtre de Ciguë.

PLANCHE 529.

Sclarea ſylveſtris, Orvale ſauvage, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt ligneuſe, fibreuſe, odorante.

La tige eſt haute d'environ deux pieds, quarrée, creuſe, velue; les feuilles ſont rudes, d'une odeur forte, d'un gout un peu aromatique.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, bleues; il leur ſuccede quatre graines rondes, liſſes, noirâtres, dans le calice: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux herbus, incultes.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, aſtringente.

PLANCHE 530.

Scordium, Chamaras, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fleurs.

La racine eſt rampante, fibrée.

Les tiges ſont longues comme la main; elles vont quelquefois juſqu'à un pied; les unes droites, les autres ſerpentant ſur terre, en guiſe de traînaſſes; les feuilles ſont velues, blanchâtres, d'une odeur d'ail, d'un gout amer.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, de couleur rougeâtre; il leur ſuccede quatre graines au fond du calice: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides & marécageux.

PLANCHE 531.

Scorodonia, faux Scordium, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt dure, rampante, fibreuſe.

La tige s'éleve à deux ou trois pieds, quarrée, velue, moëlleuſe; les feuilles ſont velues, verd brun, d'un gout amer.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, d'un blanc verdâtre; il leur ſuccede quatre petites graines, noirâtres au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur aromatique, tirant ſur celle de l'ail.

Elle vient aux lieux incultes, montagneux, dans les bois.

VERTUS ET USAGES DES DEUX SCORDIUM.

On peut ſubſtituer la ſeconde à la premiere.

Elle eſt fondante, apéritive, diaphorétique, béchique, vulnéraire, déterſive : la doſe des feuilles & fleurs en décoction, eſt une petite poignée ſur une pinte d'eau, & en infuſion comme le Thé une bonne pincée pour un demi-ſeptier de liqueur.

Le Scordium entre dans le Vinaigre thériacal, la Thériaque, le Mithridat, l'Orviétan, l'Antidote de Mathiole, la Poudre contre les vers, l'Huile de Scorpion, l'Onguent Mondificatif d'Ache, le Diaſcordium de Fraſcator, celui de Sylvius.

PLANCHE 532.

Scorzonera, Scorſonaire, B. ANN.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt longue d'un pied, groſſe du pouce, charnue, noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, remplie d'un ſuc laiteux très doux.

La tige s'éleve de deux pieds, cannelée, creuſe; les feuilles ſont liſſes, verd obſcur.

Les fleurs ſont à demi-fleurons, jaunes; il leur ſuccede des graines longues, blanches, aigrettées : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Eſpagne; on la cultive ici dans les Potagers.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt diurétique, ſtomachale, ſudorifique, hyſtérique, alexipharmaque : la doſe du ſuc eſt de trois onces; on la donne auſſi en tiſane.

L'Eau diſtillée entre dans l'Eau divine de la Pharmacopée de Paris.

PLANCHE 533.

Scrophularia fœtida, Scrophulaire des bois, Viv.

ON se sert de sa racine, quelquefois des fleurs & graines.

La racine est longue, grosse, serpentante, blanche.

La tige s'éleve à trois pieds & plus, droite, quarrée, creuse, verd noirâtre; les feuilles sont verd brun.

Les fleurs sont monopétales en petit godet, d'un pourpre obscur; il leur succede un fruit rond, terminé en pointe, partagé en deux loges, qui contiennent nombre de petites graines brunes: *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur de Sureau très-désagréable & un gout amer.

Elle vient dans les bois un peu humides.

PLANCHE 534.

Scrophularia aquatica, Scrophulaire aquatique, Viv.

LA racine est assez grosse, garnie de fibres longues & blanches.

La tige s'éleve de quatre pieds & plus, quarrée, creuse, lisse, succulente; les feuilles sont verd de mer, d'une odeur & d'un gout très-désagréable; plusieurs sont accompagnées à leur base, de petites feuilles ou oreilles.

Les fleurs ressemblent à celles de la précédente; mais d'une couleur plus foncée. Les fruits lui sont pareils: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux aquatiques, le long des eaux.

VERTUS ET USAGES DES DEUX SCROPHULAIRES.

Elles sont les mêmes.

Elle est résolutive, émolliente, adoucissante: la dose de la racine en poudre, est un gros; l'infusion s'en fait dans du vin ou dans de l'eau.

Extérieurement elle est détersive, consolidante.

Elle entre dans l'Eau générale, dans l'Onguent Mondificatif

d'Ache. *La racine & les feuilles* entrent dans l'Eau vulnéraire; l'Emplâtre Diabotanum.

PLANCHE 535.

Secale, Seigle, ANN.

ON se sert du fruit & de la peau du fruit, qu'on nomme le son.

La racine est fibrée.

Les tiges s'élevent à six pieds & plus.

Les fleurs sont à étamines; il leur succede des fruits oblongs, bruns en dehors, blancs & farineux en dedans: *il fleurit en été.*

On le cultive dans les champs.

VERTUS.

La farine est une *des quatre farines résolutives:* quand on la substitue à celle d'orge, elle est adoucissante, résolutive, suppurative.

Le son est émollient.

PLANCHE 536.

Sedum majus, Joubarbe, VIV.

ON se sert de la plante.

La racine est petite, fibreuse.

Les tiges s'élevent d'un pied & plus, rougeâtres, moëlleuses; les feuilles sont charnues, pleines de suc, toujours vertes, un peu velues aux bords.

Les fleurs sont à dix ou douze pétales, de couleur purpurine; il leur succede un fruit ou tête, formée par autant de capsules ou fruits qui renferment plusieurs graines fort menues: *elle fleurit en été.*

Elle vient sur les rochers & sur les couvertures des chaumieres.

PLANCHE 537.

Sedum minus album, petite Joubarbe, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menue, fibrée.

Les tiges s'élevent de cinq à ſix pouces, rougeâtres; les feuilles ſont épaiſſes, ovalaires, ſucculentes, charnues.

Les fleurs ſont à cinq pétales, blanches; il leur ſuccede de petits fruits ramaſſés en tête, remplis de graines fort menues: *elle fleurit en été.*

Elle vient ſur les murailles & autres lieux arides.

VERTUS ET USAGES DES DEUX JOUBARBES.

On peut ſubſtituer la petite à la grande, comme auſſi la *Trique-Madame* ci-après, Pl. 539.

Elle eſt rafraîchiſſante, déterſive, aſtringente, réſolutive & répercuſſive: la doſe du ſuc eſt quatre onces.

Extérieurement elle eſt adouciſſante, calmante.

Les feuilles *de la grande* entrent dans l'Onguent Mondificatif d'Ache, l'Onguent Populeum. La racine, feuilles & ſuc *de la petite* entrent dans l'Emplâtre Diabotanum. Les feuilles dans l'Onguent Populeum.

PLANCHE 538.

Sedum parvum acre, Vermiculaire, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt petite, fibreuſe.

Les tiges s'élevent de deux ou trois pouces; les feuilles ſe recouvrent l'une l'autre en façon d'écailles; elles ſont ſucculentes.

Les fleurs ſont à cinq feuilles, jaunes; il leur ſuccede des fruits & graines, diſpoſées comme aux précédentes: *elle fleurit en été.*

Elle a un gout piquant, âcre & brûlant.

Elle vient ſur les murailles, ſur les toits des chaumieres & autres lieux arides, dans les prés.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt antiſcorbutique.

PLANCHE 539.

Sedum luteum, Trique-Madame, Viv.

ON se sert de toute la plante.
La racine est fibrée.

Les tiges s'élevent à cinq ou six pouces; les feuilles sont verd pâle.

Les fleurs sont à cinq pétales, jaunes; les fruits & graines comme aux précédentes : *elle fleurit en été*, vient aux mêmes lieux : ses vertus sont les mêmes que celles des deux premieres ci-dessus.

PLANCHE 540.

Senecio, Seneçon, Ann.

ON se sert de toute la plante.
La racine est petite, fibrée, blanchâtre.

La tige s'éleve d'environ un pied, cannelée, creuse; les feuilles sont verd obscur.

Les fleurs sont à fleurons jaunes; il leur succede nombre de graines ovales, aigrettées : *elle fleurit en été.*

Elle croît par-tout.

Vertus et Usages.

Elle est émolliente, adoucissante, vermifuge, résolutive, intérieurement & extérieurement.

Les feuilles entrent dans la décoction émolliente, pour les lavements de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 541.

Serpyllum, Serpolet, Viv.

ON se sert de ses feuilles & sommités.
La racine est menue, ligneuse, fibrée, brune.

Les tiges sont longues comme la main, penchées sur terre, un peu velues; les feuilles ont un gout aromatique âcre.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, purpurines; il leur ſuccede quatre petites graines, rondes au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur fort agréable.

Elle vient aux lieux incultes, ſur les montagnes arides & autres lieux ſecs.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt céphalique, ſtomachale, apéritive, nervine, pectorale : la doſe eſt une poignée en infuſion & un gros en poudre.

Extérieurement la poudre eſt céphalique en guiſe de tabac.

Les feuilles entrent dans l'Eau générale. *Les ſommités* dans l'Huile de petits chiens.

PLANCHE 542.

Serratula, Serrette, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt fibrée, d'un gout un peu amer.

La tige s'éleve de deux ou trois pieds, cannelée, rougeâtre; les feuilles ſont liſſes, verd brun.

Les fleurs ſont à fleurons purpurins, ſortants d'une tête écailleuſe; il leur ſuccede des graines ovales, aigrettées : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, conſolidante : la doſe des feuilles eſt une demi-poignée en infuſion, ou un gros de la racine en poudre.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

PLANCHE 543.

Siciliana, Toute-ſaine, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fleurs.

La racine eſt groſſe, dure, rougeâtre, garnie de longues fibres, d'un gout réſineux.

Les tiges s'élevent de deux ou trois pieds, liſſes; les feuilles ſont verd brun, garnies de petites véſicules tranſparentes com-

me au Milpertuis, Pl. 308, dont elle eſt une eſpece.

Les fleurs ſont à cinq pétales, jaunes; il leur ſuccede des baies, groſſes comme un gros pois, noires, qui renferment de petites ſemences brunes : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux ombrageux.

VERTUS.

On peut la ſubſtituer au Milpertuis, en ayant les vertus.

PLANCHE 544.

Sideritis, Crapaudine, VIV.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt dure, ligneuſe.

Les tiges ſont hautes d'un pied, quarrées, jaunâtres; les feuilles ſont velues, d'une odeur aſſez agréable, d'un gout aſtringent, un peu âcre.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, d'un blanc jaunâtre, marquetées de points rouges; il leur ſuccede quatre graines ovalaires, noirâtres au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, ſecs, montagneux.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, aſtringente, déterſive.

PLANCHE 545.

Siliquaſtrum, Gaînier.

ON ſe ſert de ſes gouſſes & graines.

C'eſt un arbre aſſez haut.

La racine eſt groſſe, dure.

L'écorce eſt brune : *il fleurit au printemps*, avant les feuilles.

Les fleurs ſont légumineuſes, purpurines, d'un gout doux un peu aigrelet; il leur ſuccede des ſiliques longues, plates, rouſſes, qui contiennent pluſieurs graines rondes, applaties, dures, rougeâtres.

Il vient dans les pays chauds, en tout terrein; on le cultive dans les jardins, pour la beauté & l'abondance de ſes fleurs.

VERTUS.

Les gousses sont astringentes; les graines sont ophtalmiques; mais il est de peu d'usage.

PLANCHE 546.

Sinapi rapi folio, Moutarde, ANN.

ON se sert de sa graine.

La racine est blanche, dure, fibreuse.

La tige s'éleve à quatre ou cinq pieds, moëlleuse, velue.

Les fleurs sont à quatre pétales, jaunes; il leur succede des gousses pointues, lisses, anguleuses, assez courtes, remplies de graines presque rondes, noirâtres, d'un gout âcre & piquant: *elle fleurit en été.*

Elle vient sur les terres neuves, le long des fossés; on la cultive dans les champs.

PLANCHE 547.

Sinapi apii folio, Moutarde blanche, ANN.

LA racine est longue comme la main, grosse du doigt, dure, blanche, fibrée.

La tige s'éleve à un pied & demi ou deux pieds; les feuilles sont garnies de poils roides.

Les fleurs sont pareilles à la précédente, d'une odeur agréable; il leur succede des gousses velues, terminées par une longue pointe vuide, qui contiennent quatre ou cinq graines presque rondes, rousseâtres: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les champs.

VERTUS ET USAGES DES DEUX MOUTARDES.

Elles sont les mêmes.

La graine est stomachale, antiscorbutique, diaphorétique, apéritive.

Extérieurement elle est sternutatoire, masticatoire, résolutive.

La graine entre dans l'Eau antiscorbutique, l'Onguent épispastique, l'Emplâtre épispastique de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 548.

Sisarum, Chervi, Viv.

ON se sert de sa racine.

La racine est formée par plusieurs petits navets, longs comme la main, gros du doigt, réunis en une tête, tendres; leur écorce est pâle, mince, blanche en dedans, d'un gout doux, un peu aromatique.

La tige s'éleve de deux ou trois pieds, cannelée.

Les fleurs sont en parasol, blanches, odorantes; il leur succede deux graines accollées, oblongues, cannelées, brunes: *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Potagers.

VERTUS.

Elle est apéritive, vulnéraire; on s'en sert rarement en Médecine.

PLANCHE 549.

Sisymbrium aquaticum, Raifort d'eau, Viv.

ON se sert de sa racine.

La racine est longue, fibrée, d'un gout âcre.

La tige s'éleve de trois pieds ou plus, cannelée, creuse.

Les fleurs sont à quatre pétales, jaunes; il leur succede une petite silique, partagée en deux loges, qui contiennent des graines menues, rondes: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux aquatiques & dans l'eau.

PLANCHE 550.

Sisymbrium palustre, Raifort de Marais, Viv.

ELle ressemble en tout à la précédente; les feuilles en sont seulement découpées plus profondément. Elle vient aux mêmes lieux.

PLANCHE 551.

Siſymbrium paluſtre repens, petit Creſſon ſauvage, Viv.

LA racine eſt rampante, déliée, blanchâtre, d'un gout âcre. Les tiges ſe traînent à terre, longues d'un pied & demi, cannelées; les feuilles ſont verd noirâtre, d'un gout de Creſſon.

Les fleurs & graines comme aux précédentes : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides & aquatiques.

VERTUS DES TROIS SISYMBRIUM.

Elles ſont antiſcorbutiques, apéritives, diurétiques, déterſives; mais on s'en ſert rarement en Médecine.

PLANCHE 552.

Siſymbrium, Barbarea, Herbe de Sainte-Barbe, B. Ann.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt oblongue, aſſez groſſe, blanche, d'un gout âcre.

La tige s'éleve d'un pied & demi, cannelée, moëlleuſe; les feuilles ſont verd foncé, luiſantes, d'un gout moins fort que celui de la racine.

Les fleurs ſont à quatre pétales, jaunes; il leur ſuccede des ſiliques longues, qui contiennent pluſieurs graines menues, rouſſes : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides.

VERTUS.

Elle eſt antiſcorbutique, vulnéraire, déterſive, en infuſion, en tiſane.

PLANCHE 553.

Sisymbrium sophia chirurgorum, Thalitron, Ann.

ON se sert de sa graine.

La racine est blanche, longue, fibrée.

La tige s'éleve d'un pied & demi ou deux pieds, & quelquefois plus, un peu

Les feuilles sont verd blanchâtre, d'un gout douceâtre, un peu âcre.

Les fleurs sont à quatre pétales, jaune pâle; il leur succede des siliques longues & étroites, remplies de graines menues, rondes, rougeâtres: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, secs, sur les vieilles murailles, parmi les pierres.

Vertus.

Elle est vulnéraire, détersive, fébrifuge: la dose de la graine est un gros.

Extérieurement elle est détersive.

PLANCHE 554.

Sison, Sison, B. Ann.

ON se sert de la graine.

La racine est peu enfoncée en terre, blanche, d'un gout de Panais un peu aromatique.

La tige s'éleve de trois à quatre pieds, moëlleuse, lisse.

Les fleurs sont en parasol, blanches; il leur succede deux graines accollées, menues, arrondies, cannelées, brunes, d'un gout aromatique: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides.

Vertus.

Elle est une *des quatre semences chaudes mineures, sous le nom d'Amome*, parce qu'elle a l'odeur du véritable Amome, Pl. 51.

Elle est carminative.

PLANCHE

PLANCHE 555.

Smilax aspera, Liseron piquant, Viv.

ON se sert de sa racine.

La racine est grosse du petit doigt, longue, serpentante, dure, blanchâtre, fibreuse.

Les tiges sont sarmenteuses, garnies d'épines & de mains, avec lesquelles elles s'élevent, s'attachant aux corps voisins; les feuilles sont marquées de taches blanches, épineuses sur les bords & en dessous.

Les fleurs sont à six pétales, blanches, odorantes; il leur succede des fruits ronds, mollets, rouges, qui contiennent deux ou trois graines rondes, lisses, rouge brun en dehors, blanches en dedans, d'un gout fade & désagréable : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Provence, en Languedoc; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

La racine est dessicative, sudorifique, atténuante : la dose de sa poudre est depuis demi-gros jusqu'à deux gros, & de la décoction jusqu'à demi-once.

PLANCHE 556.

Smilax convolvulus major, grand Liseron, Viv.

ON se sert de la plante.

La racine est longue, menue, blanche, fibreuse.

Les tiges sont sarmenteuses, cannelées, grimpant très-haut, quand elles sont soutenues; les feuilles sont lisses, verd gai.

Les fleurs sont monopétales en cloche, très-blanches; il leur succede un fruit presque rond, gros comme une petite cerise, enveloppé par le calice, contenant deux graines anguleuses, couleur de suie : *elle fleurit en été.*

Elle est remplie de lait.

Elle vient dans les haies & broussailles, aux lieux un peu humides.

VERTUS.

Elle est purgative : la dose est depuis 20 grains jusqu'à trente. Extérieurement elle est résolutive, anodine.

V.

PLANCHE 557.

Smilax convolvulus minor, petit Liseron, Viv.

ON se sert de la plante.

La racine est très-longue, menue, rampante, fibrée.

Les tiges sont rampantes & grimpantes, mais plus rudes & bien moins longues que celles de la précédente.

Les fleurs lui ressemblent, mais elles sont plus petites, & leur blanc est mêlé en dehors de couleur de rose; les fruits sont arrondis & contiennent des semences assez grosses, anguleuses.

Elle vient presque par-tout.

VERTUS.

Elle est vulnéraire, détersive, résolutive, anodine.

PLANCHE 558.

Smyrnium, Maceron, B. Ann.

ON se sert de sa racine & graine.

La racine est assez longue, blanche, empreinte d'un suc âcre & amer, d'une odeur & d'un gout tirants sur la Myrrhe.

La tige s'éleve de trois pieds, cannelée; les feuilles sont verd brun, d'une odeur aromatique, d'un gout tirant sur celui du Persil.

Les fleurs sont en parasol, blanchâtres; il leur succede deux graines accollées, grosses, presque rondes, cannelées, noires, d'un gout amer : *elle fleurit en été.*

Elle vient entre les rochers marécageux, proche de la mer; elle reste verte toute l'année; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES.

La graine est cordiale, carminative; on la substitue à celle du Persil de Macédoine, Pl. 451.

La racine peut être substituée à celle d'Ache, Pl. 149.

La graine entre dans l'Electuaire lithrontiptique, dans la Poudre de l'Electuaire de Justin.

PLANCHE 559.

Soda cochleato ſemine, grande Soude, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt ferme, fibreuſe.

Les tiges ou rameaux ſont d'un pied & demi, rougeâtres; les feuilles ſont charnues, ſucculentes.

Les fleurs ſont à étamines, ſortant d'un calice jaunâtre à cinq feuilles; il leur ſuccede un fruit preſque rond, contenant une graine noire, luiſante, tournée en ſpirale : *elle fleurit en eté.*

Elle vient aux pays chauds, près la mer; on la cultive aux environs de Montpellier & dans les Jardins de Botanique.

PLANCHE 560.

Soda kali ſpinoſum, Soude épineuſe, ANN.

LA racine eſt fibreuſe.

Les tiges deviennent longues d'un pied & demi, ſucculentes, d'un verd blanchâtre; les feuilles ſont empreintes d'un ſuc ſalé; elles ſe terminent par une pointe roide.

Les fleurs ſont à étamines; il leur ſuccede au fond du calice épineux, une graine pareille à la précédente.

Elle vient aux mêmes lieux.

VERTUS DES DEUX SOUDES.

Elles ſont apéritives, déſobſtruantes, diurétiques; on s'en ſert peu en Médecine.

Extérieurement elles ſont déterſives.

PLANCHE 561.

Solanum, Morelle, ANN.

ON ſe ſert de ſes feuilles, ſommités & baies.

La racine eſt longue, fibreuſe, chevelue.

La tige s'éleve d'un pied & demi, anguleuſe, verd noirâtre les feuilles ſont du même verd, liſſes, pleines d'un ſuc verdâtre, d'un gout herbeux & fade.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en cinq pointes, blanches; il leur ſuccede des fruits, gros comme des grains de Genevrier, Pl. 88, liſſes, ſucculents, ou noirs, ou rouges, ou jaunes, qui renferment pluſieurs graines menues, applaties, blanchâtres : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur aſſoupiſſante.

Elle vient aux lieux incultes, près des maiſons, à l'ombre.

Vertus et Usages.

On ne doit s'en ſervir qu'extérieurement, vu que priſe intérieurement elle peut être très-dangereuſe.

Extérieurement elle eſt adouciſſante, anodine.

Les feuilles entrent dans le Baume tranquille, l'Onguent Mondificatif d'Ache. *Les ſommités* dans l'Onguent Populeum. *Le ſuc des baies & de la plante* dans l'Onguent Diapompholigos.

PLANCHE 562.

Solanum tuberoſum, Pomme de terre, Viv.

ON ſe ſert de la racine.

La racine eſt tubereuſe, oblongue, inégale, groſſe quelquefois comme le poing, charnue, couverte d'une écorce rouge, noirâtre.

La tige s'éleve de trois pieds & plus, velue, verte, tachetée de rouge, creuſe, cannelée, ſucculente; les feuilles ſont verd brun, velues, luiſantes en deſſus.

Les fleurs ſont monopétales, refendues en cinq; il leur ſuccede des fruits ronds, ſucculents, rouge brun, qui contiennent pluſieurs graines arrondies, menues, jaunes : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Virginie; on la cultive en Angleterre, ſous le nom de *Patates* & en France.

Vertus.

C'eſt le ſeul Solanum qui ſoit ſans mauvais effet, pris intérieurement; on en mange les tubéroſités de la racine; on ne s'en ſert point en Médecine.

PLANCHE 563.

Soldanella, Chou marin, Viv.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt menue, fibreuſe.

Les tiges ſont ſarmenteuſes, rampantes, longues de deux pieds; les feuilles ſont liſſes, luiſantes, remplies d'un ſuc laiteux.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, de couleur purpurine; il leur ſuccede des fruits preſque ronds, qui renferment des graines noires, anguleuſes : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient ſur les ſables de la mer.

Toute la plante a un gout âcre, amer, un peu ſalé.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt purgative, hydragogue : la doſe en poudre eſt depuis demi-gros juſqu'à un gros; celle du ſuc eſt de demi-once. L'extrait ſe donne depuis demi-gros, juſqu'à un gros & demi.

Les feuilles ſeches entrent dans la Poudre Hydragogue de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 564.

Sonchus lævis, Laiteron doux, Ann.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt petite, fibreuſe, blanche.

La tige s'éleve d'un pied & demi, creuſe, cannelée; les feuilles ſont liſſes, remplies d'un ſuc laiteux.

Les fleurs ſont à demi-fleurons jaunes; il leur ſuccede des fruits en cône, qui renferment de petites graines oblongues, aigrettées, d'un brun rouge.

Toute la plante eſt laiteuſe : *elle fleurit en été.*

Elle vient preſque par-tout & en tout terrein.

Nota. Qu'il s'en trouve une eſpece dont les feuilles reſſemblent à celles d'endive, Pl. 256; mais du reſte comme celle-ci.

PLANCHE 565.

Sonchus asper, Laiteron épineux, ANN.

ELle reſſemble quaſi en tout aux précédentes ; elle n'en differe que par ſes feuilles, qui ſont entieres & d'un gout aſſez agréable, quoiqu'un peu ameres.

VERTUS DES LAITERONS.

Ils ont les mêmes vertus, qui ſont d'être rafraîchiſſants, adouciſſants.

PLANCHE 566.

Sorbus, Cormier.

ON ſe ſert de ſes fruits.

C'eſt un arbre aſſez grand.

La racine eſt longue, dure, groſſe.

Le tronc eſt droit, couvert d'une écorce pâle, rude ; le bois eſt très-dur, rougeâtre ; les feuilles ſont velues, verdâtres en deſſus, blanchâtres deſſous, d'un gout un peu âcre, aſtringent.

Les fleurs ſont à cinq pétales, blanches ; il leur ſuccede un fruit verd & rouge, de la groſſeur d'une prune, charnu, ayant la chair jaunâtre, d'un gout acerbe & rude ; il devient enſuite un fruit mou, de couleur roux brun en dehors & en dedans ; alors il a le gout doux & agréable ; il renferme à ſon centre quelques pepins, reſſemblants à ceux de la Poire : *il fleurit en été.*

On le cultive dans les Vignes & dans les Vergers.

PLANCHE 567.

Sorbus torminalis, Aliſier.

ON ſe ſert de ſes fruits.

C'eſt un arbre de moyenne taille.

La racine eſt groſſe & profonde en terre.

Le tronc eſt couvert d'une écorce liſſe, blanchâtre ; les branches ont une écorce brune, rougeâtre, aſtringente, un peu amere ; le bois eſt blanc & très-dur ; les feuilles ont un gout légérement aſtringent.

Les fleurs ſont à cinq pétales, blanc pâle; il leur ſuccede des fruits ronds, ſemblables à ceux de l'Epine blanche, Pl. 384; mais plus gros, jaunâtres, parſemés de petits points blancs, d'un gout d'abord auſtere; ils molliſſent enſuite comme les précédents & deviennent d'une agréable acidité; ils ſont partagés en cinq loges, chacune contenant un ou deux pepins, châtain clair: *il fleurit en été.*

Il vient dans les bois.

VERTUS DES DEUX SORBIERS.

Leurs fruits ſont aſtringents, rafraîchiſſants.

Extérieurement la poudre en eſt déterſive, deſſicative.

PLANCHE 568.

Sphondilium, Berce, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt groſſe, longue, charnue, blanche, empreinte d'un ſuc jaunâtre, d'un gout doux-amer & âcre.

La tige s'éleve à trois ou quatre pieds, droite, velue, cannelée, creuſe; les feuilles ſont duvetées, d'un gout douceâtre.

Les fleurs ſont en paraſol, blanches; il leur ſuccede deux graines accollées, grandes, rayées, ovales, d'une odeur déſagréable, d'un gout un peu âcre: *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés & lieux aquatiques.

VERTUS.

Extérieurement elle eſt émolliente, réſolutive.

PLANCHE 569.

Stachis major, Epi-fleuri, B. ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt dure, ligneuſe, fibrée, jaunâtre.

La tige eſt droite, quarrée, veloutée, blanche, moëlleuſe; les feuilles ſont cotonneuſes, blanches, d'une odeur aſſez agréable.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, velues par dehors,

purpurines; il leur succede quatre graines, noirâtres au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Toute la plante rend une odeur aromatique forte.

Elle vient aux lieux incultes.

VERTUS.

Elle est diurétique, hystérique, mais de très-peu d'usage.

PLANCHE 570.

Staphisagria, Herbe aux poux, B. ANN.

ON se sert de sa graine.

La racine est longue, dure.

La tige s'éleve d'un pied & demi ou deux pieds, droite, velue; les feuilles sont velues.

Les fleurs sont à cinq pétales, bleu foncé; il leur succede un fruit, composé de trois ou quatre gaînes cornues, assemblées, verdâtres, qui contiennent plusieurs graines, noirâtres en dehors, jaunâtres en dedans, triangulaires, de la grosseur d'un petit pois, rudes, d'un gout amer, brûlant & très-désagréable : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux sombres, en Provence & en Languedoc; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

On ne s'en sert point intérieurement, à cause de sa vertu purgative & vomitive, très-dangereuse.

Extérieurement elle est vulnéraire, détersive : sa poudre fait mourir les poux.

PLANCHE 571.

Statice major, grand Staticé, VIV.

ON se sert de la plante.

La racine est longue, rougeâtre, divisée en plusieurs têtes.

Les feuilles sont verd de mer; les pédicules des fleurs s'élevent à un pied, creux.

Les fleurs sont à cinq pétales, purpurines; il leur succede

une capsule, qui contient une graine pointue par les deux bouts, renfermée dans le calice : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux montueux.

VERTUS.

Elle est vulnéraire, astringente ; on se sert de son suc.

Extérieurement elle a les mêmes vertus.

PLANCHE 572.

Stramonium, Pomme épineuse, ANN.

ON se sert des feuilles.

La racine est grosse, fibreuse, blanche.

La tige s'éleve de trois à quatre pieds & plus, creuse, un peu velue ; les feuilles sont verd foncé, d'une odeur très-puante & assoupissante.

Les fleurs sont monopétales en entonnoir, blanches ou violettes, d'une odeur moins désagréable ; il leur succede un fruit gros comme une noix, armé de piquants assez mols, séparé intérieurement en quatre loges, qui contiennent plusieurs graines noires, faites en rein, d'un gout désagréable : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins de Botanique ; on la trouve quelquefois à la campagne.

VERTUS ET USAGES.

Il est dangereux de s'en servir intérieurement ; cependant depuis peu quelques-uns en ont employé l'extrait, mais en très-petite dose, pour les affections du cerveau.

Extérieurement elle est adoucissante, anodine, résolutive.

Les feuilles entrent dans le Baume tranquille.

PLANCHE 573.

Suber, Liege.

ON se sert de l'écorce.

C'est un arbre de hauteur moyenne & quelquefois haut.

La racine est longue, grosse, dure.

L'écorce eſt épaiſſe, ſpongieuſe, légere, d'un gris jaune; les feuilles ſont vertes en deſſus, blanches en deſſous.

Les fleurs ſont à étamines, reſſemblant à celles du Chêne, Pl. 480, & les fruits ou glands de même : *il fleurit en été.*

Il vient en Provence, en Rouſſillon, en Gaſcogne, dans les Pyrénées.

VERTUS.

L'écorce eſt aſtringente, déterſive : la doſe en poudre eſt d'un demi-gros à un gros; en décoction depuis demi-once juſqu'à une once dans une pinte d'eau.

Sa cendre brûlée eſt extérieurement adouciſſante.

PLANCHE 574.

Syringa, Lilas.

ON ſe ſert de ſa graine.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt déliée, dure, rampante.

Les tiges ſont couvertes d'une écorce verdâtre, moëlleuſes; les feuilles ſont liſſes, luiſantes, d'un gout un peu âcre & amer.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en quatre, pourpre bleuâtre; il leur ſuccede un fruit oblong, applati, rouge, partagé en deux loges, qui contiennent des graines de même forme, pointues par les deux bouts, de couleur rouſſe : *il fleurit au printemps.*

Il vient en Orient; on le cultive dans les boſquets.

PLANCHE 575.

Syringa alba, Seringat.

LA racine eſt branchue, rampante.

C'eſt un arbriſſeau.

Les tiges ſont couvertes d'une écorce cendrée, moëlleuſes; les feuilles ſont rudes, d'un gout un peu amer & âcre.

Les fleurs ſont à quatre pétales, blanches, d'une odeur agréable; il leur ſuccede un petit fruit noirâtre, diviſé en quatre

loges, remplies de graines menues, oblongues : *il fleurit au printemps.*

On le cultive dans les boſquets.

VERTUS DES DEUX SERINGATS.

Les graines du premier ſont aſtringentes en poudre ou en décoction.

Les feuilles du ſecond, *idem ;* mais ils ſont tous deux fort peu en uſage.

T.

PLANCHE 576.

Tamariſcus Germanica, Tamaris d'Allemagne.

ON ſe ſert de ſon écorce & racine.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt groſſe comme la jambe ; ſon écorce eſt un peu épaiſſe & fort amere.

Les tiges ſont couvertes d'une écorce rougeâtre ; les feuilles ſont verd de mer, d'un gout aſtringent.

Les fleurs ſont à cinq pétales, d'un blanc incarnat ; il leur ſuccede un petit fruit oblong, pointu, triangulaire, qui renferme pluſieurs graines menues, triangulaires, aigrettées : *il fleurit en été.*

Il vient aux lieux humides & pierreux, en Hongrie & dans pluſieurs Contrées d'Allemagne.

PLANCHE 577.

Tamariſcus Narbonenſis, Tamaris.

C'Eſt un arbriſſeau.

La racine eſt groſſe, dure, branchue.

Les tiges ſont couvertes d'une écorce rude, griſe en dehors, rougeâtre en dedans ; le bois eſt blanc ; les feuilles ſont verd pâle.

L'épi des fleurs eſt plus ſerré ; les fleurs & graines plus petites que le premier ; d'ailleurs ſemblables : *il fleurit en été.*

Il vient aux bords de la mer, aux pays chauds de la France & de l'Europe.

VERTUS DES DEUX TAMARIS.

Elles ſont les mêmes.

Ils ſont apéritifs, déſobſtruants, atténuants : la doſe de l'écorce & racine eſt une once par pinte de liqueur; l'extrait eſt depuis un gros juſqu'à deux.

Extérieurement ils ſont émollients.

PLANCHE 578.

Tanacetum, Tanaiſie, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles & ſommités.

La racine ſe diviſe en pluſieurs fibres ſerpentantes.

Les tiges s'élevent de deux ou trois pieds, rayées, un peu velues, moëlleuſes; les feuilles ſont verd jaunâtre, d'une odeur forte, d'un gout amer.

Les fleurs ſont à fleurons, d'un jaune doré; il leur ſuccede des graines menues, noirâtres : *elle fleurit en été.*

Elle vient en terrein humide.

PLANCHE 579.

Tanacetum coſtus hortorum, Coq, pâté, VIV.

LA racine eſt oblique en terre, fibrée.

Les tiges s'élevent de deux pieds & demi, cannelées, velues, verd pâle; les feuilles ſont verd clair, d'une odeur agréable & forte, d'un gout amer aromatique.

Les fleurs ſont en tout ſemblables à la précédente; il leur ſuccede des graines menues, applaties, enfermées au fond du calice : *elle fleurit en été.*

On la cultive dans les Jardins.

VERTUS ET USAGES DES DEUX TANAISIES.

La premiere eſt ſtomachale, fébrifuge, ſudorifique, vermifuge, apéritive : la doſe du ſuc eſt trois ou quatre onces; celle des ſommités, deux poignées en infuſion ſur trois chopines d'eau.

Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

Les feuilles entrent dans l'Eau générale. *Les fleurs* dans la Poudre contre les vers, l'Orviétan.

La ſeconde peut être ſubſtituée à la précédente; elle eſt céphalique, hyſtérique, vermifuge.

PLANCHE 580.

Taxus, If.

C'Eſt un arbre aſſez bas, toujours verd.

La racine eſt dure & profonde en terre.

Le bois eſt très-dur, rougeâtre, veiné; les feuilles ſont verd noirâtre, luiſantes en deſſus, d'un gout un peu amer.

Les fleurs ſont à étamines, verd pâle, leſquelles avec leurs ſommets ont l'apparence d'un petit champignon; elles ſont ſtériles; les fruits naiſſent en des endroits ſéparés; ce ſont des baies molles, rouges, ſucculentes, de la groſſeur d'un gros pois, creuſés par le haut; au milieu du creux ſe voit une petite élévation; ces baies enferment une graine ovale, brune, remplie d'une moëlle d'un gout aſſez agréable: *il fleurit au printemps.*

Il vient aux pays chauds, en Italie, en Provence & en Languedoc, ſur les montagnes; on le cultive dans les Parterres.

VERTUS.

Quoique cet arbre ne ſoit d'aucune utilité en Médecine, on le décrit ici pour avoir occaſion de déſabuſer les perſonnes qui croient que cet arbre, ſur-tout ſes fruits, ſont vénimeux. Des expériences réitérées ont fait reconnoître qu'en ce pays-ci, il n'a aucune qualité nuiſible.

PLANCHE 581.

Tertianaria, Centaurée bleue, VIV.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt menue, rampante, fibreuſe, blanche.

La tige s'éleve d'un pied & demi, quarrée, un peu rude; les feuilles ſont verd brun, rudes, d'un gout amer.

Les fleurs ſont monopétales en gueule, d'un violet bleu,

marquées de petits points d'un bleu foncé; il leur ſuccede quatre graines preſque rondes au fond du calice: *elle fleurit en été.*

Son odeur eſt aſſez agréable.

Elle vient aux lieux aquatiques.

VERTUS.

Elle eſt fébrifuge, vulnéraire, aſtringente; néanmoins on s'en ſert peu.

PLANCHE 582.

Tetragonia, Fuſain.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fruits.

C'eſt un arbriſſeau.

La racine eſt dure, longue.

Il s'éleve de ſept à huit pieds & plus; l'écorce eſt verte; le bois eſt aſſez dur, d'un jaune pâle.

Les fleurs ſont à quatre pétales, verd pâle; il leur ſuccede un fruit rouge, relevé de quatre côtes; ces côtes ou loges renferment chacune une graine ovale, jaune ſafrané en dehors, remplie de moëlle blanche, d'un gout amer & déſagréable: *il fleurit en été.*

Il vient dans les bois.

VERTUS.

Ses fruits ſont purgatifs & vomitifs, au nombre de trois ou quatre.

Extérieurement il eſt vulnéraire, déterſif.

PLANCHE 583.

Thalictrum, Rue des Prés, VIV.

ON ſe ſert de toutes les parties de la plante.

La racine eſt rampante, fibreuſe, jaunâtre, d'un gout déſagréable, un peu amer.

La tige s'éleve de quatre à cinq pieds & plus, cannelée, creuſe; les feuilles ſont vertes, luiſantes.

Les fleurs ſont à quatre pétales, de couleur herbeuſe; il leur ſuccede des capſules à trois angles, qui renferment une graine

oblongue, très-menue, cannelée, d'un gout amer : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés & autres lieux humides.

VERTUS.

La racine eſt purgative, ſtomachique, apéritive : la doſe eſt du triple de la Rhubarbe; les feuilles ſont laxatives à la doſe d'une poignée; le ſuc des feuilles & fleurs ſe donne depuis une once juſqu'à deux.

Extérieurement la graine eſt aſtringente.

PLANCHE 584.

Thlaſpi vulgatius, Taraſpic, B. ANN.

ON ſe ſert de ſa graine.

La racine eſt menue, dure, fibreuſe, blanche, un peu âcre.

La tige s'éleve d'un pied, velue; les feuilles ſont verd cendré, d'un gout âcre & piquant.

Les fleurs ſont à quatre pétales, blanches; il leur ſuccede un fruit oval, applati, compoſé de deux panneaux ou loges, qui contiennent des graines plates, preſque rondes, noires, d'un gout âcre & piquant : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, ſecs, parmi les bleds, ſur les murailles.

Thlaſpi allium redolens, Taraſpic ſentant l'ail, ANN.

La racine eſt fibreuſe, blanche.

Les tiges ne s'élevent qu'à quatre ou cinq pouces; les fleurs & fruits reſſemblent à la précédente : *elle fleurit au printemps.*

Toute la plante ſent l'ail & a un gout aſſez agréable, & un peu âcre.

On la cultive dans les Jardins de Botanique.

PLANCHE 585.

Thlaſpi ſiliquis latis, Taraſpic des champs, ANN.

LA racine eſt petite, oblique en terre, fibrée, blanche, d'un gout âcre, légérement amer.

La tige s'éleve d'environ un pied, cannelée; les feuilles ſont liſſes, verd noirâtre, d'une odeur approchant de l'ail, d'un gout un peu âcre.

Les fleurs ſont petites, pareilles aux précédentes; il leur ſuccede des ſiliques larges & grandes, ainſi que les graines, qui ſont rouge brun, d'un gout âcre, chaud & piquant: *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les champs, parmi les bleds.

VERTUS ET USAGES DES TROIS TARASPICS.

Leurs vertus ſont les mêmes.

Elles ſont inciſives, déterſives, apéritives, diurétiques, hyſtériques: la doſe eſt depuis un ſcrupule juſqu'à deux.

Extérieurement elles ſont maſticatoires.

La graine du premier entre dans la Thériaque, le Mithridat.

PLANCHE 586.

Thymelæa foliis Lini, Garou, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.

C'eſt un ſous-arbriſſeau.

La racine eſt longue, groſſe, dure, rougeâtre en dehors, blanche en dedans, d'un gout doux d'abord, & enſuite brûlant & cauſtique.

La tige eſt groſſe comme le pouce; elle s'éleve d'un pied à deux pieds de haut; les feuilles ſont toujours vertes.

Les fleurs ſont monopétales en entonnoir, découpées en quatre, blanches; il leur ſuccede un fruit, gros comme celui du Myrte, Pl. 396, rouge, charnu, ovale, ſucculent, qui contient une graine noire, blanche en dedans, d'un gout brûlant: *il fleurit en été.*

Il vient aux lieux incultes & proche de la mer, dans nos pays chauds & en Espagne, en Italie; on le cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

C'est un purgatif très-dangereux; c'est pourquoi on ne s'en sert pas intérieurement.

Extérieurement la racine est vesicatoire.

PLANCHE 587.

Thymus Creticus, Thim de Crete, VIV.

ON se sert de la plante.

La racine est dure, fibreuse.

La tige & les rameaux s'élevent à neuf pouces ou un pied; les feuilles sont blanchâtres, d'un gout âcre.

Les fleurs sont monopétales en gueule, purpurines; il leur succede quatre graines, arrondies au fond du calice : *elle fleurit en été.*

Toute la plante a une odeur aromatique très-agréable, & un gout chaud & pénétrant.

Elle vient dans l'Isle de Candie, dans toute la Grece, en Espagne.

PLANCHE 588.

Thymus, Thim, VIV.

LA tige & les rameaux s'élevent de six pouces ou environ; les feuilles sont verd cendré.

Les fleurs & les fruits ressemblent à la premiere, ainsi que l'odeur agréable; elle vient dans nos pays chauds; on la cultive dans les Jardins.

VERTUS ET USAGES DES DEUX THIMS.

Elles sont céphaliques, béchiques, stomachiques, en infusion ou décoction.

Extérieurement elles sont résolutives, fortifiantes.

Les feuilles entrent dans l'Eau générale. *Les fleurs* dans le Sirop de Stœchas. *Les sommités fleuries* dans la Décoction aroma-

tique, la Poudre réjouiſſante, l'Huile de Renard. *L'Huile diſtillée* dans le Baume nervin, apoplectique. *L'Eau diſtillée* dans l'Eau de mille-fleurs.

PLANCHE 589.

Thyſſelinum, Perſil de Marais, Viv.

ON ſe ſert de la racine.

La racine eſt longue, rouge brun, empreinte d'un ſuc laiteux, d'un gout âcre très-déſagréable.

La tige s'éleve de quatre pieds, cannelée, creuſe; les feuilles ſont laiteuſes comme la racine, d'un gout amer, âcre & déſagréable.

Les fleurs ſont en paraſol, d'un blanc jaunâtre; il leur ſuccede deux graines accollées, larges, rayées : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux humides & marécageux, dans les prés.

VERTUS.

Elle eſt inciſive, pénétrante, apéritive, en décoction.

Extérieurement elle eſt maſticatoire.

PLANCHE 590.

Tilia, Tilleul.

ON ſe ſert de ſes fleurs, des fruits, des feuilles.

C'eſt un grand arbre.

La racine s'étend beaucoup & s'enfonce profondément en terre.

Le tronc eſt couvert d'une écorce, cendrée en dehors, blanc jaune en dedans; le bois eſt tendre, blanchâtre; les feuilles ſont un peu velues, luiſantes.

Les fleurs ſont à cinq pétales, blanc jaunâtre, d'une odeur agréable; il leur ſuccede une coque, groſſe comme un gros pois, anguleuſe, velue, qui contient une ou deux ſemences arrondies, noirâtres, d'un gout doux : *il fleurit en été.*

On le cultive dans les Jardins.

VERTUS ET USAGES.

Les fleurs ſont céphaliques : la doſe eſt une pincée, infuſée comme le Thé.

Les baies ſont aſtringentes : la doſe eſt un gros en poudre, dans un bouillon ; les feuilles ſont apéritives, diurétiques, hyſtériques.

Les fleurs entrent dans l'Eau générale, antiépileptique. *L'Eau diſtillée* entre dans l'Eau d'Hyrondelle.

PLANCHE 591.

Tinctorius flos, Gaude, ANN.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt groſſe du petit doigt, dure, blanche, très-peu fibrée, d'un gout de Creſſon âcre.

La tige s'éleve de trois pieds, liſſe, verdâtre.

Les fleurs ſont à trois pétales inégaux, jaune verdâtre ; il leur ſuccede des capſules rondes, terminées par trois pointes. Elles renferment pluſieurs graines arrondies, menues, noirâtres : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes ; on la cultive dans pluſieurs Provinces pour la teinture jaune.

VERTUS.

La racine eſt apéritive en décoction.

PLANCHE 592.

Tithymalus paluſtris, Tithymale de Marais, VIV.

ON ſe ſert de l'écorce de ſa racine.

La racine eſt très-groſſe, rampante, dure, blanche.

Les tiges s'élevent à trois & quatre pieds, rougeâtres ; les feuilles ſont liſſes.

Les fleurs ſont jaunes ; les unes à cinq pétales ſtériles ; les autres à quatre pétales, auxquelles il ſuccede des fruits raboteux à trois loges, chacune contenant une graine preſque ronde, remplie d'une moëlle blanche : *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt pénétrée d'un lait âcre, brûlant, cauſtique.
Elle vient aux lieux montagneux.

PLANCHE 593.

Tithymalus cataputia, Epurge, ANN.

ON ſe ſert de ſes fruits.
La racine eſt garnie de quelques fibres déliées.
La tige s'éleve à quatre pieds & plus, rougeâtre; les feuilles ſont liſſes, verd bleuâtre.
Les fleurs ſont à quatre pétales, jaunes; il leur ſuccede un fruit, gros comme une balle de piſtolet, verd relevé de trois coins ou loges, chacune contenant une graine, groſſe comme un grain de poivre, remplie d'une moëlle blanche : *elle fleurit en été.*
Toute la plante eſt laiteuſe, d'un lait pareil à la premiere.
On la cultive dans les Jardins.

PLANCHE 594.

Tithymalus amygdaloides, Tithymale à feuille d'amandier, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine.
La racine eſt menue, fibrée, dure, rouge brun en dehors, blanche en dedans, amere & âcre.
Les tiges s'élevent à un demi-pied ou un pied; les feuilles ſont verd de mer, d'un gout aſtringent, âcre, amer.
Les fleurs ſont à quatre pétales, jaune verdâtre; il leur ſuccede un fruit verdâtre, liſſe, partagé en trois loges, dont chacune contient une graine rouſſeâtre : *elle fleurit en été.*
Toute la plante eſt laiteuſe comme les précédentes.
Elle vient dans les plaines ſablonneuſes.

VERTUS DES TROIS TITHYMALES.

Elles ſont toutes trois de violents purgatifs hydragogues.
Les payſans ſe ſervent du fruit de l'Epurge, depuis quatre juſqu'à douze.
La racine de la derniere ci-deſſus en poudre, à la doſe d'un

demi-gros jusqu'à un gros dans un bouillon, trois jours de suite, purge violemment par haut & par bas; elle s'emploie pour guérir les fievres intermittentes.

Extérieurement leur lait est dépilatoire & consomme les verrues.

PLANCHE 595.

Tordylium, Seseli de Candie, Ann.

ON se sert de sa racine & graines.

La racine est menue, blanche.

La tige est haute d'un pied & demi à deux pieds, cannelée, velue; les feuilles sont velues, rudes.

Les fleurs sont en parasol, blanches; celles du tour plus allongées que celles du milieu; il leur succede deux graines accollées, ovalaires, applaties, bordées en grains de chapelet, odorantes, un peu âcres: *elle fleurit en été.*

Elle vient sur le bord des vignes, dans les bleds; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

La racine est incisive, pectorale: la graine est diurétique, hystérique; elle est de peu d'usage.

PLANCHE 596.

Tormentilla, Tormentille, Viv.

ON se sert de sa racine.

La racine est un tubercule, gros au moins comme le pouce, inégale, ou droite, ou oblique en terre, noirâtre en dehors, rougeâtre en dedans, un peu fibrée, d'un gout astringent & amer.

Les tiges sont longues d'environ un pied, couchées à terre; les feuilles sont velues.

Les fleurs sont à quatre pétales, jaunes; il leur succede un fruit presque rond, qui contient nombre de graines menues, oblongues: *elle fleurit en été.*

Elle vient presque par-tout, aux lieux incultes.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt vulnéraire, aſtringente : la doſe eſt depuis demi-once juſqu'à une once en décoction dans une pinte d'eau ; ou en ſubſtance, & en poudre depuis demi-gros juſqu'à un gros.

Extérieurement elle eſt deſſicative & cicatriſante.

Elle entre dans l'Eau générale, la Décoction aſtringente, le Diaſcordium, la Confection d'Hyacinthe. *L'extrait* entre dans la Thériaque céleſte.

PLANCHE 597.

Tragopogon, Serſifi, B. ANN.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt groſſe du petit doigt, longue, droite en terre, laiteuſe, douce au gout.

La tige s'éleve d'environ deux pieds, creuſe.

Les fleurs ſont à demi-fleurons, d'un bleu pourpre ; il leur ſuccede des graines allongées, rondes, cannelées, rudes, noirâtres, aigrettées : *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt pleine d'un lait doux.

On la cultive dans les Potagers.

PLANCHE 598.

Tragopogon pratenſe, Serſifi ſauvage, B. ANN.

ELle reſſemble beaucoup à la précédente ; les différences ſont qu'elle ne s'éleve pas tout-à-fait tant, que ſes fleurs ſont jaunes, & que les graines ſont de couleur cendrée.

Elle vient dans les prés.

VERTUS DES DEUX SERSIFI.

Elles ſont apéritives, ſtomachales, pectorales, émollientes ; on peut les ſubſtituer à la racine de Scorſonere, Pl. 532 ; mais leurs vertus ſont plus foibles.

Extérieurement les feuilles du Serſifi ſauvage ſont déterſives, conſolidantes.

PLANCHE 599.

Tribulus terreſtris, Saligot terreſtre, ANN.

ON ſe ſert du fruit.

La racine eſt longue, fibreuſe, blanche.

Les tiges ſont longues d'environ demi-pied, couchées par terre, velues, rougeâtres; les feuilles ſont velues.

Les fleurs ſont à cinq pétales, jaunes; il leur ſuccede un fruit dur, armé de pluſieurs pointes qui partent de cinq cellules, qui renferment des graines oblongues : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans nos pays chauds, en Italie, en Eſpagne.

VERTUS.

Elle eſt déterſive, aſtringente, apéritive : la doſe en poudre eſt depuis un ſcrupule juſqu'à un gros.

PLANCHE 600.

Tribulus aquaticus, Châtaigne d'eau, ANN.

ON ſe ſert du fruit.

De la baſe du fruit qui germe au fond de l'eau, s'éleve une racine ou tige garnie par intervalle de quatre filets, découpés profondément, imitants la diſpoſition des barbes de plumes non preſſées. Cette racine groſſit par dégrés, & forme hors de l'eau une tête de laquelle partent les feuilles, dont la queue a un renflement; elles ſont liſſes.

Les fleurs ſont à quatre pétales, blanches; les pédicules qui les ſoutiennent ſont duvetés; il leur ſuccede un fruit, gros comme une petite Châtaigne, noir, armé de quatre groſſes pointes liſſes, qui renferme une amande blanche, d'un gout tirant ſur la vraie Châtaigne : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans l'eau, ſoit courante ou dormante.

VERTUS.

Elle eſt aſtringente, rafraîchiſſante, réſolutive, intérieurement & extérieurement.

PLANCHE 601.

Trifolium officinarum, Treffle des Prés, Viv.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt groſſe d'environ le petit doigt, rampante, fibreuſe.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi, cannelées; les feuilles ſont marquées d'une tâche noire ou blanche dans leur milieu.

Les fleurs ſont légumineuſes, ramaſſées en une tête, pourpres, d'une odeur foible aſſez agréable, d'un gout légérement aſtringent; il leur ſuccede une petite capſule ronde, terminée en queue, qui contient une graine faite en rein : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés & autres lieux humides.

VERTUS.

Elle eſt déterſive, rafraîchiſſante, adouciſſante, intérieurement & extérieurement.

PLANCHE 602.

Trifolium lagopus, Pied de lievre, Ann.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt tortue, dure, fibreuſe, blanche.

La tige s'éleve d'un demi-pied, couverte d'un duvet blanchâtre; les feuilles ſont lanugineuſes, blanchâtres.

Les fleurs ſont légumineuſes, raſſemblées en épis ou têtes, blanches; l'épi, en général, a une couleur cendrée; il eſt garni de duvet; il leur ſuccede une petite capſule ronde, terminée par une queue, qui contient une graine faite en rein : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bleds.

Toute la plante a un gout aſtringent, deſſicatif.

VERTUS.

Elle eſt aſtringente : la doſe une poignée ſur trois chopines d'eau, réduites à une pinte.

PLANCHE 603.

Trifolium bituminoſum, Treffle odorant, Viv.

C'Eſt un ſous-arbriſſeau ; on ſe ſert de ſon ſuc.

La tige eſt baſſe ; la hauteur, en général, eſt de trois pieds ou environ ; les feuilles ſont verd clair, velues, viſqueuſes, d'une forte odeur de bitume.

Les fleurs ſont légumineuſes, pourpre violet ; le calice eſt velu ; il leur ſuccede une capſule, qui contient une graine noirâtre, pointue, rude, d'une odeur & d'un gout légumineux : *il fleurit en été.*

Il vient aux lieux pierreux, vers la mer, dans nos pays chauds, en Candie, en Sicile ; on le cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

C'eſt un remede contre le cancer : la doſe du ſuc eſt depuis une cuillerée juſqu'à deux, dans deux ou trois verres d'eau.

PLANCHE 604.

Trifolium lotus ſiliquoſa, Lotier hémorrhoïdal, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles.

La racine eſt longue, dure.

Les tiges s'élevent à deux ou trois pieds, velues, dures ; les feuilles ſont cotonneuſes, blanchâtres, d'un gout très-aſtringent.

Les fleurs ſont légumineuſes, blanchâtres ; il leur ſuccede des ſiliques un peu groſſes, de couleur rouge brun, qui contiennent une graine ronde, petite, jaunâtre : *elle fleurit en été.*

Elle vient en Languedoc & autres pays chauds.

VERTUS.

La Poudre des feuilles ſeches eſt adouciſſante, à la doſe d'un ou deux gros.

PLANCHE 605.

Trifolium lotus corniculata, petit Lotier, Viv.

ON se sert de la plante.

La racine est menue, longue, dure, noire, branchue, rampante, fibrée, d'un gout douceâtre, astringent.

Les tiges se couchent d'abord, puis se relevent; elles deviennent longues de huit à neuf pouces, d'un gout astringent.

Les fleurs sont légumineuses, jaunes; il leur succede des capsules longues & étroites, qui renferment plusieurs graines taillées en rein : *elle fleurit en été.*

Elle vient presque par-tout.

VERTUS.

Elle est déterstive, apéritive, vulnéraire; mais on s'en sert rarement.

PLANCHE 606.

Triticum, Froment, B. ANN.

ON se sert de l'écorce de son fruit, nommée *son*, d'une préparation de sa pulpe, nommée *amidon*, de sa farine aigrie, appellée *levain*, & de sa farine cuite, nommée *pain*.

La racine est composée de plusieurs fibres déliés.

Les tiges, tuyaux ou pailles s'élevent à quatre ou cinq pieds, creux; les épis sont sans barbes; les fleurs qui en sortent sont à étamines; il leur succede des graines ovales, sillonnées d'un côté, jaunes en dehors, remplies d'une pulpe blanche : *elle fleurit en été.*

Cette plante a beaucoup de variétés; on la cultive dans les champs, en presque tous les pays habités.

VERTUS.

Le son est rafraîchissant, adoucissant, pectoral, émollient, déterstf en tisane, en décoction : extérieurement il est émollient, résolutif.

L'amidon est pectoral, rafraîchissant, incrassant.

Le levain est maturatif, } extérieurement.
La mie de pain résolutive, }

PLANCHE 607.

Tuſſillago, Pas d'âne, Viv.

ON ſe ſert de ſes fleurs, feuilles & racines.

La racine eſt rampante, longue, menue, blanchâtre.

Les fleurs viennent *au premier printemps*, avant les feuilles; les tiges qui portent les fleurs, s'élevent d'environ un pied, creuſes, cotonnées, rougeâtres, accompagnées de folioles.

Les fleurs ſont radiées, jaunes; il leur ſuccede des graines oblongues, applaties, aigrettées : quand les fleurs ſont paſſées, les feuilles paroiſſent; elles ſont vertes en deſſus, blanchâtres & cotonneuſes en deſſous, ameres, gluantes, un peu aſtringentes.

Elle vient aux lieux frais & humides.

Vertus et Usages.

Elle eſt béchique, adouciſſante : la doſe eſt deux ou trois pincées, feuilles & fleurs; par pinte de liqueur en décoction.

Extérieurement les feuilles ſont adouciſſantes.

La racine entre dans le Sirop d'Eryſimum. *Les feuilles* dans le Sirop de grande Conſoude, de Tortue. *Les fleurs* dans la décoction pectorale, le Sirop de Roſſolis.

V.

PLANCHE 608.

Valeriana hortenſis, Valériane des Jardins, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt groſſe du pouce, à fleur de terre, fibreuſe en deſſous, de couleur jaune brun, d'une odeur forte, déſagréable, d'un gout aromatique.

Les tiges s'élevent d'environ trois pieds, liſſes, creuſes; les feuilles ſont liſſes.

Les fleurs ſont monopétales en tuyau découpé en cinq, blanc pourpre, d'une odeur douce de jaſmin; il leur ſuccede une graine oblongue, applatie, aigrettée : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les Alpes & hautes montagnes; on la cultive dans les Parterres.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt apéritive, diurétique, ſudorifique : la doſe en poudre dans le vin blanc, eſt depuis un gros juſqu'à deux, & en tiſane depuis deux gros juſqu'à demi-once.

Elle entre dans la Thériaque, le Mithridat, le *Laurea alexandrina*.

PLANCHE 609.

Valeriana ſylveſtris, Valériane des bois, VIV.

ON ſe ſert de ſa racine & feuilles.

La racine eſt rampante, fibreuſe, blanchâtre, d'une odeur pénétrante, d'un gout aromatique.

La tige s'éleve à la hauteur d'un homme, creuſe, cannelée, un peu velue; les feuilles ſont un peu velues en deſſous.

Les fleurs ſont monopétales, partagées en cinq, diſpoſées en paraſol, d'un blanc rougeâtre; il leur ſuccede des graines aigrettées : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois humides.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt antiépileptique, ſudorifique, hyſtérique : la doſe des racines en décoction, eſt depuis deux gros juſqu'à demi-once, & en poudre depuis demi-gros juſqu'à un gros.

La racine entre dans l'Eau générale, Thériacale, d'Hyrondelle, Epileptique, le Mithridat, l'Orviétan, la Poudre de Guttete, l'Onguent Martiatum. *La racine & les feuilles* entrent dans l'Emplâtre Diabotanum. *L'extrait* entre dans la Thériaque céleſte.

PLANCHE 610.

Valeriana paluſtris, Valériane aquatique, VIV.

ELle reſſemble beaucoup à la précédente; les différences ſont que la racine a une odeur agréable; que la tige ne s'éleve que d'environ un pied; qu'*elle fleurit au printemps*, & qu'elle vient aux lieux aquatiques, marécageux.

VERTUS.

Elle a les vertus des précédentes, mais plus foibles; on s'en ſert rarement.

PLANCHE 611.

Valerianella, Mâche, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt menue, fibreuſe, d'un gout doux.

La tige s'éleve d'un demi-pied, cannelée, creuſe; les feuilles ſont verd pâle, d'un gout douceâtre.

Les fleurs ſont monopétales en tuyau refendu en cinq; il leur ſuccede une graine un peu applatie, blanchâtre : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bleds, dans les vignes.

VERTUS.

Elle eſt rafraîchiſſante, déterſive, antiſcorbutique, adouciſſante.

PLANCHE 612.

Veratrum helleboraſter, Pied de griffon, B. ANN.

ON ſe ſert de ſa racine.

La racine eſt oblique en terre, fibreuſe, dure; ſon écorce eſt noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, un peu âcre, amere.

La tige s'éleve d'un pied & demi, verd rougeâtre, d'une odeur déſagréable; les feuilles ſont verd noirâtre.

Les fleurs ſont à pluſieurs pétales, verdâtres; il leur ſuccede un fruit, compoſé de pluſieurs ſiliques cornues, raſſemblées, qui contiennent des graines noires, preſque rondes : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient dans les bois, aux lieux incultes, montagneux.

VERTUS.

On ne s'en ſert point intérieurement; on en fait des ſetons aux beſtiaux, pour attirer l'humeur en dehors.

PLANCHE 613.

Verbaſcum mas, Bouillon-blanc, B. Ann.

ON ſe ſert de ſes fleurs & feuilles.

La racine eſt aſſez groſſe, longue, dure, blanche, fibreuſe.

La tige devient haute de cinq à ſix pieds, cotonneuſe; les feuilles ſont cotonneuſes & blanches deſſus & deſſous.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en cinq, jaunes; il leur ſuccede une coque ovale, diviſée en deux loges, qui renferment quantité de graines menues, anguleuſes, noirâtres: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, ſecs & ſablonneux.

Verbaſcum fœmina, Bouillon-blanc femelle, B. Ann.

Elle reſſemble en tout à la précédente, excepté qu'elle ne s'éleve pas tant, que les fleurs ſont un peu plus grandes, les feuilles plus longues & plus pointues, & que les graines tirent ſur le brun; elle vient aux mêmes lieux.

Vertus et Usages des deux Bouillon-blanc.

Elles ſont les mêmes.

Elle eſt adouciſſante, vulnéraire, réſolutive, pectorale; on prend les fleurs par pincées, en infuſion comme le Thé.

Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum.

PLANCHE 614.

Verbena, Verveine, B. Ann.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt fibrée, oblongue blanche, légérement amere.

La tige s'éleve d'un pied & demi; les feuilles ſont d'un verd plus foncé en deſſus qu'en deſſous, d'un gout amer, déſagréable.

Les fleurs ſont monopétales en tuyau, découpées en cinq, bleues ou blanchâtres; il leur ſuccede quatre graines oblongues, au fond du calice: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes.

VERTUS ET USAGES.

Elle eſt déterſive, vulnéraire, hyſtérique, fébrifuge : la doſe en infuſion eſt quatre onces ; celle du ſuc eſt depuis deux onces juſqu'à quatre.

Extérieurement elle eſt réſolutive.

Les feuilles entrent dans l'Eau vulnéraire, la Poudre contre la rage, l'Onguent Mondificatif d'Ache, l'Emplâtre de Bétoine. *Les ſommités* entrent dans l'Huile de ſcorpions compoſée.

PLANCHE 615.

Verbeſina, Chanvre aquatique, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt fibrée, blanche, d'un gout aromatique.

La tige s'éleve de deux à trois pieds, un peu velue, rougeâtre ; les feuilles ſont liſſes, d'un gout un peu âcre.

Les fleurs ſont à fleurons, jaune verdâtre ; il leur ſuccede des graines oblongues, anguleuſes, rougeâtres, terminées par trois pointes : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux aquatiques, marécageux.

VERTUS.

Elle eſt vulnéraire, apéritive, diurétique, hyſtérique ; cependant elle eſt peu en uſage.

PLANCHE 616.

Veronica mas, Véronique mâle, VIV.

ON ſe ſert de toute la plante.

La racine eſt déliée, fibreuſe, éparſe en terre.

Les tiges ſont longues de ſix pouces, couchées ſur terre ; les feuilles ſont verd pâle, velues, d'un gout amer & âcre.

Les fleurs ſont monopétales, découpées en quatre, bleu clair ; il leur ſuccede un fruit plat, taillé en cœur, partagé en deux loges, qui contiennent pluſieurs graines menues, arrondies, noirâtres : *elle fleurit en été.*

Elle reſte verte toute l'année.

Elle vient aux lieux incultes, arides, dans les bois.

PLANCHE 617.

Veronica pratenſis, Véronique des prés, Viv.

LA racine eſt menue, longue, rampante, fibreuſe.
Les tiges s'élevent de près d'un pied, velues.
Les fleurs ſont d'un beau bleu, pareilles, ainſi que les graines, à la précédente.
Elle vient dans les prés humides.

PLANCHE 618.

Veronica fœmina minor, Véronique de haie, Ann.

LA racine eſt rampante, fibreuſe.
Les tiges s'élevent d'un pied & plus, velues; les feuilles ſont velues, verd foncé.
Les fleurs ſont vrai bleu & comme les précédentes, ainſi que les graines.
Le gout de la plante eſt un peu amer.
Elle vient dans les bois & pâturages.

PLANCHE 619.

Veronica ſpicata, Véronique à épi, Viv.

LA racine eſt oblique en terre, fibreuſe.
La tige s'éleve d'un demi-pied, droite; les feuilles ſont velues.
Les fleurs & fruits comme les précédentes.
Elle vient dans les pâturages & bois ſablonneux, & arides.

Vertus et Usages des quatre Véroniques.

La premiere ou la mâle eſt préférée à toutes les autres, & eſt très-célebre en Médecine; on la nomme même le Thé de l'Europe; on peut lui ſubſtituer les trois autres.
Elle eſt ſudorifique, vulnéraire, déterſive, diurétique, pectorale: la doſe des feuilles eſt une pincée en infuſion dans un demi-ſetier d'eau, ou une petite poignée dans un bouillon.
Extérieurement elle eſt vulnéraire, déterſive.

Les

Les feuilles de Véronique mâle entrent dans l'Eau vulnéraire, générale, le Baume vulnéraire, le Mondificatif d'Ache. *Le suc* entre dans l'Onguent Oppodeltoc.

PLANCHE 620.

Viburnum, Vioine.

ON se sert de ses baies & feuilles.

C'est un arbrisseau.

La racine court à fleur de terre.

La tige & les rameaux s'élevent à dix ou douze pieds; l'écorce est blanchâtre & comme farineuse; les feuilles sont velues, cotonneuses, plus blanchâtres en dessous qu'en dessus, d'un gout astringent.

Les fleurs sont monopétales, découpées en cinq, blanches, odorantes, imitant l'odeur du Sureau; il leur succede des baies molles, presque ovales, noires, d'un gout douceâtre, peu agréable, qui contiennent une graine applatie, cannelée, très-dure: *il fleurit en été*

VERTUS.

Il est rafraîchissant, astringent, en décoction, en gargarisme.

PLANCHE 621.

Vicia, Vesce, ANN.

ON se sert de sa graine.

La racine est déliée, fibreuse.

Les tiges s'élevent d'un pied & demi à deux pieds, cannelées, creuses, velues; les feuilles sont velues; la côte à laquelle elles tiennent, finit par une main qui saisit les corps voisins, au moyen de quoi la plante se soutient.

Les fleurs sont légumineuses, purpurines ou bleuâtres; il leur succede des gousses à deux cosses, qui contiennent des graines presque rondes, noires, d'un gout désagréable: *elle fleurit en été.*

Il se trouve une Vesce dont les graines sont couleur de chair, d'ailleurs ressemblant à la précédente.

On cultive la Vesce dans les campagnes.

VERTUS.

Elle eſt aſtringente, épaiſſiſſante, conſolidante; ſa farine ſe ſubſtitue à celle d'Orobe, Pl. 432.

Extérieurement elle eſt émolliente, réſolutive, fortifiante.

PLANCHE 622.

Viola martia, Violette de Mars, VIV.

ON ſe ſert de ſes feuilles, fleurs & racine.

La racine eſt fibrée, touffue.

Elle n'a point de tiges; elle jette des filets qui prennent racine çà & là; les pédicules des fleurs s'élevent à quatre ou cinq pouces.

Les feuilles ſont vertes toute l'année.

Les fleurs ſont à cinq pétales violets, d'une odeur très-agréable, d'un gout un peu âcre; il leur ſuccede une coque ovale, remplie de pluſieurs graines preſque rondes, blanchâtres: *elle fleurit au premier printemps.*

Elle vient aux lieux ombrageux, incultes; on la cultive dans les Jardins.

VERTUS ET USAGES.

Les fleurs ſont une *des quatre fleurs cordiales;* elles ſont laxatives, rafraîchiſſantes; les calices des fleurs & les graines ſont très-purgatives; les racines données à la doſe de deux ou trois onces, ſont purgatives & vomitives; les feuilles ſont adouciſſantes, diurétiques, laxatives.

Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum, dans le lavement émollient de la Pharm. de Paris. *Les fleurs* dans le Sirop d'Eryſimum, de Tortue, le *Requies*, la Poudre Diamargaritum frigidum. *Les fleurs & graines* dans l'Electuaire lénitif, le Diaprun. *Les graines* dans l'Electuaire Pſyllium, le Catholicum, le Diaphœnic, la Confection Hamech, les Pilules *fine quibus.*

PLANCHE 623.

Viola matronalis, Julienne, Viv.

ON se sert de ses feuilles & fleurs.

La racine est petite, dure, blanche.

Les tiges s'élevent de deux pieds, velues, moëlleuses; les feuilles sont velues, d'un gout un peu âcre; elles restent vertes toute l'année.

Les fleurs sont à quatre pétales, blanches, tirant sur le pourpre, marbrées de blanc & de rouge, d'une odeur très-agréable; il leur succede de longues siliques, séparées par une cloison; elles contiennent plusieurs graines applaties, ovales, roussâtres, âcres: *elle fleurit en été.*

On la trouve quelquefois dans les bois; on la cultive dans les Jardins.

VERTUS.

Elle est incisive, apéritive, antiscorbutique, sudorifique, pectorale; cependant on s'en sert rarement.

PLANCHE 624.

Viola lunaria, grande Lunaire, B. Ann.

ON se sert de ses graines.

La racine est glanduleuse & par tubercules.

La tige s'éleve de deux à trois pieds, velue, verd de mer; les feuilles sont velues, ayant un gout d'herbe.

Les fleurs sont à quatre pétales, pourpre clair, rayées de pourpre, de peu d'odeur; il leur succede de grandes siliques, plates, arrondies, d'un blanc argenté, luisant, renfermant des graines taillées en rein, de couleur rouge brun, d'un gout très-âcre, un peu amer; elle reste verte tout l'hiver: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux pays froids, sur les hautes montagnes; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

Elle est incisive, détersive, apéritive, vulnéraire, diurétique: la dose est depuis un scrupule jusqu'à un gros.

PLANCHE 625.

Viorna clematitis, Herbe aux gueux, Viv.

ON se sert de sa seconde écorce & de ses feuilles.

La racine est assez grosse, fibreuse, rougeâtre.

Les tiges sont grosses, sarmenteuses, rudes, anguleuses, s'attachant & s'entortillant aux arbustes & arbres voisins, montant ainsi jusqu'au haut des grands arbres; les feuilles ont un gout âcre.

Les fleurs sont à quatre pétales, blanches, odorantes; il leur succede plusieurs graines assemblées, terminées par de longues barbes chevelues : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les haies, dans les grands bois.

Vertus.

Elle est trop caustique pour s'en servir intérieurement.

Extérieurement elle est déterstive.

PLANCHE 626.

Viperina, Herbe aux viperes, B. Ann.

ON se sert des mêmes parties qu'on emploie dans la Buglose, Pl. 183.

La racine est grosse du pouce, dure, longue.

La tige s'éleve de plus de deux pieds, velue, verte, marquetée de points noirs, rudes, imitant une peau de serpent; les feuilles sont velues, rudes, d'un gout fade.

Les fleurs sont monopétales en entonnoir, refendues en cinq parties inégales, bleu purpurin; il leur succede quatre semences, semblables à la tête d'une vipere, au fond du calice; elle reste verte tout l'hiver : *elle fleurit en été.*

Elle vient presque par-tout, aux lieux incultes, dans les bleds.

Vertus.

Elle est humectante, émolliente, pectorale; mais inférieurement à la Buglose, à laquelle on peut la substituer.

PLANCHE 627.

Virga aurea, Verge d'or, Viv.

ON ſe ſert de ſes feuilles & fleurs.

La racine eſt traçante, brune, fibreuſe, d'un gout aromatique.

La tige s'éleve de trois pieds & plus, cannelée, moëlleuſe; les feuilles ſont velues, verd foncé.

Les fleurs ſont radiées, jaune doré; il leur ſuccede des graines oblongues, aigrettées : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les bois, en terrein ſec & montagneux.

VERTUS ET USAGES.

Les feuilles & fleurs entrent dans *les Vulnéraires Suiſſes;* elles ſont déterſives, vulnéraires, diurétiques : la doſe en infuſion, eſt une pincée ſur deux taſſes d'eau bouillante.

Elle entre dans l'Eau générale.

PLANCHE 628.

Viſcum, Gui.

ON ſe ſert de ſon bois & du fruit.

C'eſt un ſous-arbriſſeau paraſite, qui ne vient jamais ſur la terre, mais ſur pluſieurs eſpeces d'arbres, tant ſauvages, que fruitiers : on eſtime mieux celui qui vient ſur le Chêne; c'eſt une ancienne opinion à laquelle il ne faut pas s'arrêter.

La racine eſt verte en deſſus, ligneuſe dans ſon milieu, ſerpentant dans la ſubſtance de l'écorce des branches de l'arbre ſur lequel il croît.

Les tiges ſont groſſes du petit doigt, inclinées en tous ſens, longues d'environ deux pieds, verd brun en dehors, blanc jaunâtre en dedans; les feuilles ſont épaiſſes, dures, verd jaunâtre, d'un gout douceâtre, peu amer & aſtringent, d'une odeur déſagréable.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, découpées en quatre, verdâtres, ſtériles; les fruits précédés de fleurs pareilles, viennent ſur d'autres pieds; ce ſont des baies rondes, couleur de

perle, groſſes comme un pois, remplies d'un ſuc viſqueux, âcres & ameres, renfermant une graine taillée en cœur, applatie, verdâtre; il eſt verd toute l'année : *il fleurit au printemps.*

VERTUS ET USAGES.

Il eſt antiépileptique : la doſe de la Poudre eſt depuis un gros juſqu'à deux, & en infuſion demi-once ſur ſix onces de liqueur.

Les baies ſont un purgatif dangereux; mais extérieurement elles ſont maturatives, ſuppuratives, réſolutives, émollientes.

Il entre dans l'Eau générale, d'Hyrondelle, la Poudre antiſpaſmodique, de Guttette.

PLANCHE 629.

Viſnaga, Cure-dent d'Eſpagne, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt longue, fibreuſe.

La tige s'éleve d'environ deux pieds, cannelée, liſſe; les feuilles ſont liſſes.

Les fleurs ſont en paraſol, blanchâtres; il leur ſuccede deux graines accollées, velues, d'un gout âcre : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux pays chauds, en Italie, en Eſpagne, en Languedoc; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS.

Elle eſt apéritive, diurétique, hyſtérique; mais on s'en ſert peu.

PLANCHE 630.

Vitis, Vigne.

ON ſe ſert de ſes fruits, qu'on nomme *Raiſins.*

La racine eſt longue, dure, peu profonde.

Les tiges ſont ſarmenteuſes, tortues; l'écorce eſt brun rougeâtre; elle porte quantité de mains ou vrilles, qui s'attachent aux corps voiſins; les feuilles ſont vertes, luiſantes, d'un gout aſtringent.

Les fleurs ſont à cinq pétales, diſpoſés en rond, réunis par leur pointe, jaunâtres, odorants; il leur ſuccede des baies ron-

des ou ovales, verd pâle, ou rouges, ou noires, remplies d'un suc doux & agréable, qui contiennent cinq graines formées en cœur : *elle fleurit en été.*

Il y a quantité d'especes de vignes que l'on cultive, tant dans les pays chauds, que tempérés.

Les deux grappes qui sont dans l'estampe, font voir différentes grosseurs de raisins, ainsi que leurs formes, plus rondes ou plus allongées.

VERTUS.

La liqueur qui sort des jeunes pousses, coupées au printemps, est apéritive intérieurement, détersive extérieurement. *Les bourgeons & feuilles* en poudre, sont astringents à la dose d'un gros, dans un bouillon. *Le bois* est fort apéritif, sa cendre prise à la dose d'une once, dans une pinte d'eau. *Le verjus* ou raisin non encore mûr, est rafraîchissant & un peu astringent. *Les raisins bien mûrs* sont laxatifs & pectoraux, pris en petite quantité. *Le marc de raisin* est sudorifique & nervin, extérieurement. *L'Eau de vie* & *l'Esprit de vin*, doivent être pris modérément dans l'intérieur ; mais extérieurement ils sont vulnéraires, détersifs. *Le vinaigre* ou vin aigri, est rafraîchissant & astringent, pris modérément, & alexitaire extérieurement. *Le vin* est stomachique & cordial.

PLANCHE 631.

Vitis idæa, Myrtille, airelle, VIV.

ON se sert de ses fruits.

C'est un petit sous-arbrisseau.

La racine est menue, ligneuse, rampante.

Il s'éleve d'un pied ou un pied & demi ; son écorce est verte ; les feuilles sont lisses, d'un gout astringent.

Les fleurs sont monopétales en grelot, d'un blanc rougeâtre ; il leur succede des baies, grosses comme un grain de Genievre, Pl. 88, succulentes, bleu foncé ou noirâtres, d'un gout astringent, un peu acide, assez agréable, qui contiennent plusieurs graines menues, d'un rouge pâle : *il fleurit en été.*

Il vient aux lieux incultes, dans les bois.

VERTUS.

La poudre des fruits séchés est astringente, depuis un gros jusqu'à deux ; en décoction jusqu'à demi-once. Le suc ou rob est astringent, calmant.

PLANCHE 632.

Ulmaria, Reine des prés, VIV.

ON se sert de sa racine.

La racine est assez grosse, longue du doigt, noirâtre en dehors, rouge brun en dedans, garnie de fibres rougeâtres, odorante.

La tige s'éleve de trois pieds, anguleuse, creuse, lisse, rougeâtre ; les feuilles sont vertes en dessus, blanchâtres en dessous.

Les fleurs sont à plusieurs pétales, blanchâtres, d'une odeur agréable ; il leur succede un fruit à plusieurs gaînes, torses, ramassées ensemble, qui contiennent chacune une graine assez menue : *elle fleurit en été.*

Elle vient dans les prés & autres lieux humides.

VERTUS ET USAGES.

Elle est sudorifique, cordiale, vulnéraire, en décoction : la dose de l'extrait est un gros.

Extérieurement elle est vulnéraire, détersive.

Elle entre dans l'Eau générale. *Les feuilles* dans le lait alexitaire de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 633.

Ulmus, Orme.

ON se sert de l'écorce & des feuilles.

C'est un grand arbre.

La racine est grosse, dure, traçant au loin de côté & d'autre, peu profondément en terre.

Le tronc est gros ; l'écorce est raboteuse, rude, de couleur cendrée, rougeâtre ; les feuilles sont verd peu foncé.

Les fleurs naissent *au printemps*, avant les feuilles ; elles sont monopétales en entonnoir, à pavillon découpé, garnies de pe-

tites étamines de couleur obscure ; il leur succede un fruit assez grand, plat, presque ovale, qui renferme une graine plate, blanche, succulente, douce au gout.

Il vient dans les bois ; on le cultive en avenues & en différents plans.

Vertus et Usages.

Il est astringent.

Extérieurement il est incarnatif.

Les vessies qui viennent sur ses feuilles, sont creuses & servent de nid à des pucerons, espece d'insectes qui s'y nourrissent d'une liqueur grasse & huileuse, qu'on y trouve en les ouvrant : cette liqueur est vulnéraire, astringente.

Le mucilage de l'écorce moyenne d'Orme entre dans l'Emplâtre de mucilage de la Pharm. de Paris.

PLANCHE 634.

Umbilicus Veneris, Nombril de Vénus, Viv.

ON se sert de la plante.

La racine est tubéreuse, charnue, blanche, fibreuse en dessous.

La tige s'éleve d'un pied & demi & plus ; les feuilles sont épaisses, succulentes, verd de mer, d'un gout gluant & insipide.

Les fleurs sont monopétales en cloche, découpées, blanches ou purpurines ; il leur succede un fruit à plusieurs gaînes membraneuses, qui renferment des graines fort menues : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient aux lieux arides, sur les rochers.

PLANCHE 635.

Umbilicus Veneris alter, Cotyledon à fleurs jaunes, Viv.

LA racine est longue, rampante.

La tige est rougeâtre & ne s'éleve pas tant que la précédente.

Les fleurs sont monopétales en cloche, découpées en cinq, jaunes ; il leur succede un fruit, composé de cinq capsules oblon-

gues, pointues, verdâtres, remplies de graines rougeâtres, très-menues : *elle fleurit au printemps.*

Elle vient en Portugal; on la cultive dans les Jardins de Botanique.

VERTUS ET USAGES DES DEUX NOMBRILS DE VÉNUS.

La premiere eſt la plus uſitée ; on peut lui ſubſtituer la ſeconde.

Elle eſt rafraîchiſſante & peut être elle-même ſubſtituée à la Joubarbe, Pl. 536.

Les feuilles entrent dans l'Onguent Populeum.

PLANCHE 636.

Unedo, Arbouſier.

ON ſe ſert de ſes feuilles, écorce & fruits.

C'eſt un petit arbre.

La racine eſt aſſez groſſe, dure, ligneuſe.

L'écorce eſt rude; les feuilles ſont liſſes, toujours vertes.

Les fleurs ſont monopétales en grelot, blanches, d'une odeur agréable; il leur ſuccede un fruit aſſez ſemblable aux fraiſes, mais bien plus gros, charnu, d'un beau rouge, d'un gout un peu auſtere, nommé *Arbouſe*, partagé en cinq loges, qui renferment pluſieurs graines menues, oſſeuſes : *il fleurit en automne.*

Il vient dans les bois, ſur les montagnes, en Italie, en Eſpagne & dans nos pays chauds.

VERTUS.

Il eſt aſtringent, mais de peu d'uſage en Médecine.

PLANCHE 637.

Urtica major, grande Ortie, VIV.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt traçante, menue, fibrée, jaunâtre.

Les tiges s'élevent de trois pieds & plus, quarrées, creuſes, couvertes d'un poil piquant; les feuilles ſont remplies de poils très-piquants & brûlants.

Les fleurs ſont à étamines, de couleur herbeuſe, ſtériles; les fruits naiſſent ſur d'autres pieds; ce ſont des capſules pointues,

faites en fer de pique, brûlantes au toucher, qui contiennent une graine ovale, applatie, luisante : *elle fleurit en été.*

Elle vient par-tout, aux lieux incultes.

Urtica minor, Ortie grièche, ANN.

La racine est assez grosse, garnie de petites fibres.

Les tiges s'élevent à environ un pied, quarrées, cannelées, piquantes; les feuilles sont verd foncé, brûlantes au toucher.

Les fleurs sont comme les précédentes, excepté que les stériles & les fruits viennent à celle-ci sur le même pied; ces fruits sont de petites capsules qui contiennent une graine menue, roussêâtre, applatie, luisante : *elle fleurit en été* & vient aux mêmes lieux que la précédente.

PLANCHE 638.

Urtica romana, Ortie romaine, ANN.

ON se sert de sa graine.

La racine est fibreuse, jaunâtre.

La tige s'éleve de quatre à cinq pieds, garnie de petits poils roides & piquants; les feuilles sont couvertes de poils rudes, brillants & très-piquants.

Les fleurs ressemblent aux précédentes; les fruits qui viennent sur le même pied, sont ronds, de la grosseur d'une groseille, verds, hérissés de poils piquants, composés de plusieurs capsules dont chacune renferme une graine ovale, applatie, lisse, glissante : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes.

VERTUS DES TROIS ORTIES.

Elles sont déterfives, diurétiques, astringentes; les feuilles se prennent en tisane ou en infusion, comme le Thé : la dose du suc est depuis deux onces jusqu'à quatre.

Extérieurement elles sont émollientes, résolutives.

La graine entre dans le Sirop de Guimauve composé, dans l'Onguent Martiatum.

PLANCHE 639.

Usnea, Usnée.

C'Est une mousse verte qui vient sur les pierres, quelquefois sur le crâne humain; il s'éleve de petits pédicules qui soutiennent des capsules oblongues.

VERTUS ET USAGES.

Quelque part où on la trouve, elle a la même vertu, qui est d'être astringente extérieurement.

Elle entre dans les Poudres de Sympathie, dans la Pierre de Butler, dans l'Onguent d'Arquebusade.

PLANCHE 640.

Vulneraria rustica, Vulnéraire des paysans, ANN.

ON se sert de la plante.

La racine est noirâtre, droite, longue, d'un gout légumineux.

Les tiges s'élevent d'un pied, velues, un peu rougeâtres; les feuilles sont velues, blanchâtres en dessous, verd jaunâtres en dessus, d'un gout douceâtre, un peu âcre.

Les fleurs sont légumineuses, jaunes; le calice est lanugineux, argentin; il leur succede une vessie, qui contient une capsule, laquelle renferme une ou deux petites graines jaunâtres: *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux arides, montagneux.

VERTUS.

Elle est vulnéraire, consolidante; mais on s'en sert rarement.

PLANCHE 641.

Uvularia, Gantelée, Ortie bleue, VIV.

LA racine est assez grosse, branchue, blanche, du gout de la Raiponse, Pl. 489.

La tige s'éleve à deux ou trois pieds, cannelée, creuſe, rougeâtre, velue ; les feuilles ſont velues.

Les fleurs ſont monopétales en cloche, découpées en cinq, bleues ou violettes, velues en dedans ; il leur ſuccede un fruit arrondi, anguleux, diviſé en pluſieurs loges trouées par les côtés, qui contiennent beaucoup de graines menues, luiſantes, rouſſeâtres : *elle fleurit en été.*

Toute la plante eſt empreinte d'un ſuc laiteux.

Elle vient à l'ombre, dans les bois, dans les prés.

VERTUS.

Elle eſt aſtringente, déterſive, vulnéraire extérieurement.

X.

PLANCHE 642.

Xanthium, petit Glouteron, ANN.

ON ſe ſert de la plante.

La racine eſt garnie de fibres aſſez groſſes.

La tige s'éleve de deux pieds, anguleuſe, velue, marquerée de points rouges ; les feuilles ſont verd jaune, d'un gout un peu âcre, légérement aromatique.

Les fleurs ſtériles ſont à fleurons, au-deſſous deſquelles viennent les fleurs femelles, auxquelles ſuccedent des fruits, gros comme de petites olives, hériſſés de pointes, partagés en deux loges, qui contiennent des graines longuettes, rougeâtres : *elle fleurit en été.*

Elle vient aux lieux incultes, ſecs.

VERTUS.

La graine eſt diurétique en poudre, à la doſe d'un demi-gros dans le vin blanc.

Extérieurement les feuilles ſont réſolutives.

PLANCHE 643.

Xiris, Glaïeul puant, Viv.

ON ſe ſert de ſa racine & graines.

La racine eſt ronde, genouillée, fibrée, d'un gout très-âcre.

Les feuilles ſont verd noirâtre, luiſantes, ſentant la Punaiſe, Pl. 656.

Les fleurs ſont à ſix pétales, violet ſale, imitant celles de l'Iris, Pl. 23; il leur ſuccede un fruit oblong, anguleux, contenant des graines rondes, groſſes comme un petit pois, rouges, d'un gout âcre & brûlant : *elle fleurit en été.*

Elle vient à l'ombre, aux lieux humides.

Vertus.

Elle eſt apéritive, hydragogue, en décoction : la doſe de la racine en poudre eſt un gros dans le vin blanc.


Populus.
a. — 1.
A. alba.
B. nigra.
b. — 1.
b. 4.
b. 3.
a. 4.
a. 3.

A. *Porrum*.



A. *Portulacca.*

a. 1.

a. 4.

a. 3.

a. 2.

A. Primula Veris.
a.1.
a.1.
a.2.
a.2.
a.3.
a.
b.

a. 1.
A. Prunus.
a. 1.
a. 1.
a. 3.
a. 2.
a. 2.

A. *Pseudo Acacia.*

A. *Psillium erectum.*

A. *Psillium Supinum.*

a. 1.
a. 1.
a. 2.
a. 2.
a. 3.
A. Pulmonaria.

a.1.
a.1.
A. Pulmonaria gallorum.

A. *Pulsatilla*.

A. *Pyrola*.



A. *Pyrus.*

A. Quercus.
a. 1.
a. 2.
a. 3.
a. 4.

a. 1.

a. 2.

A. *Quinquefolium.*




a. 1.
a. 2.
a. 1.
A. Ranunculus bulbosus
a. 1.
Radix.

A. *Ranunculus Nemorosus.*

A. *Ranunculus repens.*


a.2.
A. Ranunculus palustris.
a.1
a.4.
a.2.



A. *Rapa.*

A. *Raphanus*.

A. *Raphanus rusticanus.*

A. *Rapunculus.*

a. 1.

a. 1.



a. 4.



a.1.
a.1.
a.1.
a.1.
A. Rapunculus Spicatus.
a.4.
a.4.

a. 1.
a. 1.
a. 1.
a. 4.
A. Reseda.
a. 1
a. 2.
a. 2.
a. 3.
a. 4.

A. *Rhamnus Catharticus*.

Rhus.

A. *Folio ulmi.*

B. *Virginiana.*

Rosa.
a. 1.
a. 1.
A. Pallida.
b. 1.
B. alba.
a. 3
b. 1
b. 3.

Rosa.
a.1.
a.1.
A. Moschata.
a.1.
a.3.
b.1.
B. Provincialis.
b.1.
b. 3.

A. Cynorrhodos.
a. 1.
a. 2.
a. 2.
a. 5.
a. 3.
dessiné par Mr de Garsault
Gravé par


a. 1.
a. 1.
a. 1.
A. Rosmarinus.
a. 3.
Dessiné par Mr de Garsault
Gravé par Morland

A. *Ros Solis.*



A. Rubeola.
a. 1.
a. 2.
a. 3.

a. 1.
a.
1.
A. Rubia tinctorum.
a. 3.

A. Rubus.

A. *Rubus idœus.*

A. *Ruscus alexandrinus.*

A. *Ruscus*.

A. *Ruta.*

A. *Sabina folio tamarisci.*

B. *Sabina folio cupressi.*

A. Salicaria.
a. 1.
a. 2.
a. 1.
a. 1.
a. 3.
a. 2.
a. 4.

A. *Salix*.



a. 2.
a. 1.
A. Salix caprea.
a. 3.

a. 1.
A. Salvia major.
B. Salvia Hispanica.
a. 1.
b. 1.
b. 3.
a. 1.
a. 3.

A. *Salvia minor.*

A. *Sambucus.*

A. *Samolus.*

a. 1.

a. 2.

a. 1.

a. 4.

A. Sanicula.
a. 2.
a. 3.
a. 1
a. 1.
a. 5.
a. 2.



A. Sainicula astrantia.
a. 1.
a. 1.
a. 1.



A. *Saponaria.*

a. 1.
a. 3.
A. Satureia.
Dessiné par Mr. Gasault
Et Gravé par Martinet

A. Satureia Spicata.

a. 1.
A. Saxifraga alba.
a. 1.
a. 1.
a. 2.

A. *Saxifraga Verna.*

a.2.

a.1.

a.1.

B. *Saxifraga Aurea.*

a.4.

a.1.

A. *Saxifraga magna.*

A. *Tragoselinum majus.*


a.4.
A. Tragoselinum minus.
a.1.

A. *Scabiosa Vulgaris.*

a. 1.
A. Scabiosa vel succisa.
a. 1
a. 1
a. 1.

a. 1.
a. 1.
a. 1.
a. 2.
a. 1
a. 2.
A. Scandix.

A. *Scilla rubra.*

A. *Scilla parva*.



A. *Sclarea sylvestris.*



A. Scordium.
a.1.
a.1.
a.1.
a.3
a.4.

A. *Scorodonia.*




A. Scorzonera.
a. 1.
a. 1.
a. 1.

a. 1.
a. 1.
a. 2.
A. Scrophularia fœtida.
a. 1.
a. 2.

A. *Scrophularia Aquatica.*


A. Secale.
a.1.
a.1.
a.2.
a.1.
a.2.

a. 1.
a. 4.
a. 2.
a. 5.
a. 3.
A. Sedum majus.

A. *Sedum minus album.*

A. *Sedum parvum acre.*





A. *Sedum luteum.*

A. Senecio.

A. *Serpyllum.*

a.1.
A. Serratula.
a.1.
a.2.
a.4.

a.1.
a.2.
a.1.
a.1.
A. Siciliana.
a.1.

a. 1.
a. 1.
a. 4.
A. Sideritis.

a. 1.
A. Siliquastrum.
a. — a.
a. 1.
a. 1.
a. 1.

a.2.
a.1.
a.1.
A. Sinapi Rapi folio.



a. 1.
a. 2.
A. Sinapi album.
a. 1.
a. 2.
a. 4.
a. 4.

A. *Sisarum.*

a. 1.

A. Sisymbrium Aquaticum.
a.1.
a.1.
a.2.

A. *Sisymbrium palustre.*

A. *Sisymbrium palustre repens*

A. *Sisymbrium barbarea.*

A. Sophia chirurgorum.

a. 1.

a. 4.

a. 1.

Dr de Garsault Delin. Martinet Sculp.

a. 1.
A. Sison.
a. 4.
a. 4.

A. *Smilax aspera fructu rubente.*

A. *Smilax Convolvulus Major.*

A. *Smilax Convolvulus minor.*

A. Smyrnium.
a.1.
a.1.

A. *Soda Cochleato Semine.*

A. *Soda Kali spinosum.*



A. *Solanum.*

A. *Solanum tuberosum.*



A. *Soldanella.*

A. *Sonchus lævis.*

A. *Sonchus asper*.

Dessiné par M.r de Garsault

Gravé par Martinet

A. *Sorbus*.

A. *Sorbus torminalis*



A. *Sphondilium.*



A. *Stachys major.*


a.1.
A. Staphisagria.
a.1.
a.1.

a.1.
A. Statice major.
a.1.

a. 2.
a. 1.
a. 2.
a. 5.
a. 1.
A. Stramonium.

A. *Suber*.

A. *Syringa lilac.*

A. *Syringa alba.*

A. Tamariscus germanica.
a. 1.
a. 1.
a. 2.
a. 3.
Dessiné par Mr de Garsault
Gravé par Mailinel

A. *Tamaricæ narbonensis.*





A. *Tanacetum*.

a. 1.

a. 1.

a. 3.

A. *Tanacetum Costus hortorum.*

A. *Taxus*.

A. Tertiaria.
a.1.
a.2.
a.1.
a.1.

A. Tetragonia.
a.
1.
a.1.
a.3.
a. 2
a.2.
a.2.

a.1.
a.1.
a. — 1.
A. Thalictrum.


A. Thlaspi Vulgatius.
a.2.
a.1.
a.2.
b.1.
B. Thlaspi allium redolens.
a.2
b.1.
b.4.
b.4.

A. *Thlaspi Siliquis latis.*







A. *Thymelæa foliis lini.*

A. *Thymus Creticus.*



A. *Thymus.*

Dessiné par M.r de Garsault

Gravé par Martinet 1763

A. *Tysselinum.*

A. Tilia.
a. 1.
a. 1.
a. 3.
a. 1.
a. 2.
a. 1.

A. *Tinctorius flos.*

A. Tithymalus palustris
a. — 2.
a. 1.
a. 4.
a. 4.

A. *Tithymalus Cataputia.*

A. *Tithymalus Amygdaloides.*

a. 2.
a. 2.
A. Tordylium.
a. 1.
a. 3.



A. *Tormentilla*.

A. *Tragopogon.*





A. Tragopogon Sylvestre.
a.1.
a.2.
a.5.



A. *Tribulus terrestris.*


A. Tribulus aquaticus.
a.2
a.
1.
a.2
a.2.
a.5.
A.







A. *Trifolium Officinarum.*

A. *Trifolium lagopus*.





A. *Trifolium bituminosum.*

A. *Trifolium lotus siliquosa.*

A. *Trifolium lotus corniculata.*

A. *Triticum.*



A. *Tussilago.*

A. *Valeriana hortensis.*

Dessiné par Mr de Gaisceaux

Et Gravé par Martinet

A. Valeriana Sylvestris.
a. 1.
a. 1.
a. 4.

A. Valeriana palustris.
a. 1.
a. 1.
a. 4.
a. 4.
a. 4.



A. *Valerianella*.

A. *Veratrum Helleboraster.*

Verbascum.

a. 1.

a. 2.

B. *fœmina.*

A. *mas.*

A. *Verbena.*

A. Verbesina.
a.1.
a.1.
a.1.
a.2.
a.4.
a.4.

A. *Veronica mas.*



A. *Veronica pratensis*.

a. 2.
a. 1.
A. Veronica fœmina minor.
a. 3.
a. 4.

A. *Veronica Spicata*

A . *Viburnum*.

A. *Vicia.*

A. *Viola martia.*

A. *Viola matronalis.*

a.2.
A. Viola lunaria.
a.3.
a.1.
a.1.

A. Viorna Clematitis.
a.1.
a.1.
a.3.
a.1.
a.1.
a.5.
a.2.

A. Viperina.
a.1
a.1.
a.4.
a.1.
a.1.

A. *Virga Aurea.*



a. 2.

a. 1.

a. 5.

a. 1.

A. Viscum.
a.1.
a.2.
a.1.
a.2.
a.1.
a.2.
a.1.
a.5.

A. *Visnaga*.


a. 1.
a. 2.
a. 1.
a. 2.
a. 2.
A. Vitis.
a. 2.
a. 2.
a. 5.

A. *Vitis idœa.*

A. *Ulmaria.*







A. *Ulmus*.

A. *Umbilicus Veneris.*

A. *Umbilicus Veneris alter.*



A. *Unedo.*

Urtica.
A. major.
a. a.
b. a.
b. a.
B. minor.

A. Urtica Romana.
a.2.
a.1.
a.2.
a.2.
a.2.

A. *Usnea*.



A. *Vulneraria*.

A. *Uvularia.*

a.1.
a.2.
a.2.
A. Xanthium.
a.2.

A. *Xiris.*

34 + Anomum
Jingiber

A	p.		p.	B	p.	
Acanthus mollis	255	Anthyrrhinum Elatine	365	Balotta nigra	242	Centaurea Cyanus
Acer Pseudo platanus	345	—— linaria	167	Bellis perennis	310	—— nigra
Achillea aggeratum	149	Apium Graveolens	168	Berberis vulg.	325	—— raphontica
—— Ptarmica	450	—— petroselinum	170	Beta vulg.	545	Cercis siliquastrum
—— mille folium	114	Apocynum venetum	171	Betonica off.	313	Cheiranthus Cheiry
Aconitum Anthora	151	Aquilegia vulg.	172	Betula alba	219	Chelidonium majus
—— napellus	636	Arbutus unedo.	138	—— alnus	438	—— Glaucium
Acorus Calamus	164	Arctium lappa	615	Bidens Tripartita	161	Chenopodium vulvaria
Adianthum Capillus veneris	4	Aristolochia longua	~~115~~	~~Boletus~~	174	—— Bonus henricus
—— americanum	4	—— rotunda	175	Borrago off.	176	—— Botrys
—— Ceterach	5	—— clematitis	178	Brassica oleracea	177	—— ambrosioides
~~—— scolopendrium~~	5	—— Pistolochia	179	—— —— v.β.	167	Chrysanthemum Leucanthemum
Adonis vernalis	30	Aristolochia ——	259	—— Erucastrum	520	Chrysosplenium opp: fol.
Adoxa moschatellina	31	—— ——	260	—— —— v.β.	221	Cicer Arietinum
Aethusa meum	31	—— ——	486	—— Rapa	222	Cichorium Intybus
Agaricus quercinus	15	Arnica montana	181	Bryonia alba	256	—— endivia
Agrimonia Eupatoria	16	—— scorpioides	444	Bupleurum rotundi. p.	86	Cistus Ladaniferus
Agrostemma Githago	119	Artemisia abrotanum	186	Buxus sempervirens	297	—— Helianthemum
Ajuga reptans	120	—— ——			163	Citrus aurantium
Alcea rosea	121	—— absinthium			227	—— medica v.β.
Alchemilla vulg.	122	—— pontica			625	Clematis vitalba
Allium sativum	252	—— vulg.			75	Cnicus arcana
—— scorodoprasum	252	—— Dracunculus			229	Cochlearia off:
—— Cepa	135	Arum maculatum	118	Cactus opuntia	488	—— armoracia
—— ascalonicum	250	—— Dracunculus	40	Calamus aromaticus	70	Coffea arabica
—— schaenoprasum	156	Asarum europeum	192	Calendula arvensis	351	Coix Lachrima
—— Porrum	157	Asclepias vinu-tanicum	489	Campanula rapunculus	230	Colchicum autumnale
Aloe sokrotina	158	Asparagus off.	641	—— Trachelium	223	Conium maculatum
Alsine media	159	Asperula odorata	193	Camphorosma monspeliaca	224	—— —— v.β.
Althea off.	499	—— tinctoria	194	Cannabis sativa	344	Convallaria
Amygdalus vulg.	126	Asplenium Ad. nigrum	195	Capparis spinosa	464	—— multiflora
—— Persica	128	—— Trichomanoides	35	Canella	356	Convolvulus sapium
Anagallis arvensis	128	—— ruta-muraria	459	Capsicum Indicum	557	—— arvensis
Anchusa off.	212	—— Ceterach	200	Carduus marianus	104	—— scammonia
Anemone Hepatica	346	—— scolopendrium	424	—— Eriophorus	232	Coriandrum sativum
—— Pulsatilla	~~99~~	~~Assa foetida~~	7	Carlina acaulis	234	Cornus mascula
—— nemorosa	96	Astragalus Tragacantha	8	—— —— v.β.	233	Corylus avellana
Anethum foeniculum	515	Astrantia major	199	Carthamus lanatus	634	Cotyledon Umbilicus
—— graveolens	101	Athamantha	202	Carum carvi	635	—— Hispanica
Angelica archangelica	245	—— Cretensis	~~42~~	~~Cassia senna~~	384	Crataegus Oxiacantha
Anthemis arvensis	428	—— oreoselinum	~~53~~		46	Crocus sativus
—— nobilis	429	—— —— v.β.	6	Centaurea Behen	36	Croton Cascarilla
—— cotula	160	Atriplex hortensis	191	—— calcitrapa	52	Cucumis colochyntis
—— pyretrum	163	Atropa mandragora	198	—— Benedicta	236	—— sativus
—— tinctoria	166	—— Belladona	205	—— Centaurium	237	—— asinicus
Anthyllis vulneraria	162	Avena sativa			373	—— melo
					228	Cucurbita citrullus

239 Cuminum Cyminum
240 Cupressus Sempervirens
+ 241. Cuscuta Europea
+ 12. Curcuma rotunda
12 —— Longa
243 Cyclamen Europeum
104 Cynanchum Syriacum
225 Cynara Scolymus
226 —— Cardunculus
244 Cynoglossum off:
13. Cyperus Longus
13 —— americanus
13 —— rotundus
109 Cytinus Hypocistis

D.

332. Daphne Laureola
333 —— mezereum
586 —— Gnidium
572. Datura Stramonium
246 Daucus Vulg:
629 —— Visnaga
570. Delphinium Sta=physagria
203 Dianthus Caryophyllus
14 Dictamnus Albus
43. —— Creticus
248 Digitalis purpurea
249 Dipsacus fullonum
+ 498 Droseras rotund: f.a
+ 10 Dorstema contrayerva

E

626. Echium vulg.
258 Equisetum fluviatile
258 —— arvense
335. Ervum lens
261. Eryngium vulgare
262. —— maritimum
135. Erysimum Alliaria
263 —— officinale
552 —— Barbarea
582. Evonymus Europeus
266. Eupatorium Cannabinum
100 Euphorbia off:
264 —— esula
292 —— palustris

593 Euphorbia tathyr
594 —— amygdaloides
265 —— Sylvatica
267. Euphrasia off.

F

+ 99 Ferula assa foetida
264. Fagus castanea
+ 50 Ficus carica
290 Filago arvensis
276 Fragaria Vesca
97 Fraxinus Ornus
277 —— excelsior
278 Fumaria off:

G.

280. Galega off:
283. Galeopsis Galeobdolon
148 Galium aparine
285 —— uliginosum
284 —— verum
16. Gentiana lutea
206 —— Centaurium
287 Geranium Columbinum
288 —— robertianum
289 —— sanguineum
201. Geum urbanum
296 Glaecoma hederacea
17. Glycyrrhyza glabra
290 Gnaphalium Dioicum
293 Gratiola off: —
38 Guiacum off: —

H.

85. Hedera helix
422. Hedisarum Onobrichis
298 Helianthus Tuberosus
299 Heliotropium Europeum
19 Helleborus niger
19 —— orientalis
20 —— viridis
612 —— foetidus
568 Heracleum Sphondylium
303 Herniaria hirsuta
623 Hesperis matronalis
456 Hieracium pilosella
476 —— murorum

304. Hordeum Hexastichon
355. Humulus lupulus
306 Hyoscyamus niger
307. —— albus
308 Hypericum perforatum
543 —— androsaemum
22. Hypecacuana off.
639 Hypnum Triquetrum
369 Hyssopus off.

I.

150. Ilex aquifolium
414 Impatiens noli-tangere
22. Imperatoria Ostrathium
257 Inula Helenium
23. Iris florentina
23 —— germanica
643 —— foetidissima
312 Juglans regia
41 Juncus odoratus
88. Juniperus communis
89 —— oxicedrus
506 —— sabina

L.

314 Lactuca sativa
315 } —— } virosa v. Sup.
316 } —— }
317. Lamium album
318 —— laevigatum
319 —— purpureum
320 Lapsana communis
330 Lavandula Spica
331 —— Stoechas
334. Laurus nobilis
336 Lemna minor rassa frat
247. Leontodon Taraxacum
197 Leonurus Cardiaca
337. Lepidium Latifolium
338 ——
401 —— sativum
402 ——
400 Leucoium vernum
340 Lichen pulmonarius
339 Ligusticum Levisticum
341 —— austriacum
342 Ligustrum Vulg.
343 Lilium album
347 Linum usitatissimum
346 —— catarticum

349 Lithospermum off.
350 —— purpuro-ceruleum
196 Lonicera Caprifolium
604 Lotus siliquosus
605 —— corniculatus
624 Lunaria vediviva
354 Lupinus albus
115 Lycoperdon cervinum
279 —— bovista
393 Lycopodium Clavatum
77 Liquidambar Styracy-fluva
415 Lysimachia nummula
443 —— vulg.
507 Lythrum salicaria

M

133. Malva alcea
357 —— silvestris
358 —— rotundifolia
390 Marchantia polimorpha
364 Marrubium vulg.
368 Matricaria parthenium
187. Melissa Calamintha
188. —— nepeta
189 —— grandiflora
371 —— off:
372 Melitis melissophyllum
190 Mentha arvensis
376 —— Gentilis
377 —— crispa
378 —— viridis
379 —— aquatica
380 —— silvestris
381 —— pulegium
375 Menyanthes trifoliata
382 Mercurialis annua
383 Mespilus Germanica
385 —— pyracantha
95. Minora
107 ——
20. Mirabilis Jalappa
389 Momordica Elaterium
390 Morus nigra
391 —— alba
394 Myagrum sativum
395 Myrica Gale
396 Myrtus communis
[illegible] —— pimenta

N.

05	Nepeta	cataria	422.
06	Nerium	oleander	445
07	Nicotiana	Tabacum	452.
08	——	perennis	115.
09	——	rustica	433
10	Nigella	arvensis	453
11	——	Damascena	173
12	——	sativa	575
16	Nymphea	alba	454
17	——	lutea	135
			490

O.

18	Ocymum	majus	455
19	——	minus	521
20	Oenanthe	fistulosa	522
21	Olea	europea	523
22	——	—— v.β.	146
27	Ononis	arvensis	458
28	Onopordum	acanthium	65
35	Ophyoglossum	vulg.	79
35	Ophris	ovata	80
37	Orchis	militaris	81
37	——	mascula	~~64~~
36	Origanum	majorana	56.
30	——	majus	57
30	——	minus	58
31	Ornithopus	perpusillus	64
32	Orobus	niger	78
33	Osmunda	regalis	87
33	Oxalis	acetosella	460

P.

35	Paeonia	off:	461
92	Panicum	Dactylon	461
86	——	miliaceum	461
87	——	Italicum	473
96	Papaver	somniferum	474
98	——	cornutum	463
99	——	Rheas	172
40	——	nigrum	269
41	Parietaria	off:	446
92	Paris	quadrifolia	447
47	Palma	major	465
			127.
			271
			272
			460

p.	Pastinaca	sativa	129
445	Periploca	Graeca	467
452.	Peucedanum	off.	467
115.	Peziza	auricula	469
433	Phalaris	oryzoides	152.
453	Phaseolus	vulg:	481
173	Phallus	esculentus.	457
575	Philadelphus	coronarius	470.
454	Phyllisca	latifolia	180
135	Physalis	alkekengy.	108
490	Phyteuma	spicata	153
455	Phytolacca	decandra	210
521	Pimpinella	magna	211
522	——	—— v.β.	471
523	——	saxifraga	608
146	——	anisum	475.
458	Pinguicula	vulg:	361
65	Pinus	Pinea	478
79	——	larix	234
80	——	Picea	360
81	——	abies	479
~~64~~	~~Pistacia~~	~~vera~~	
56.	Piper	nigrum	
57	——	longum	42.
58	——	aromaticum	53
64	Pistacia	vera	117
78	——	Therebinthus	480
87	——	lentiscus	573
460	Pisum	sativum	36.
461	Plantago	major	
461	——	media	220.
461	——	lanceolata	482
473	——	Psyllium	484
474	——	gnopsi.	485
463	Polygala	vulg:	487
172	Polygonum	Bistorta	491
269	——	fagopyrum	591
446	——	persicaria	48
447	——	Hydropiper	436
465	——	aviculare	492
127.	Polypodium	fontanum	28
271	——	filix mas	29
272	——	faemina	493
460	——	vulg.	493

p.	Polytricum	commune	294
467	Populus	nigra	294
467	——	alba	295
469	Portulaca	oleracea	66.
152.	Potentilla	anserina	67
481	——	reptans	68
457	Poterium	sanguisorba	69
470.	Primula	veris off:	472
180	Prunella	vulg:	494.
108	Prunus	spinosa	495 }
153	——	armeniaca	496 }
210	——	cerasus sativus	497
211	——	—— vulg:	500
471	——	sativa	501
608	Psoralea	bituminosa	502
475.	Pulmonaria	off:	124
361	Punica	Granatum	124
478	Pyrola	rotundifolia	321
234	Pyrus	cydonia	322
360	——	malus	323
479	——	communis	324
			326
			327
			503
			~~504~~
			505.

Q.

42.	Quassia	ou amara	111
53	Quercus	Ilex	112
480	——	robur	508.
573	——	suber	509
36.	Quinquina	off:	559

R.

220.	Ranunculus	ficaria	560
482	——	Bulbosus	305.
484	——	repens	510
485	——	sceleratus	510
487	Raphanus	sativus	511
491	Reseda	lutea	529
591	——	luteola	512.
48	Rhamnus	Ziziphus	254
436	——	Paliurus	513.
492	——	Catharticus	514
28	Rheum	rhabarbarum	516
29	——	monachorum	517
493	Rhus	coriaria	518
493	——	vernix	587

p.	Ribes	Rubrum	
294	——	uva crispa	
295	——	nigrum	
66.	Ricinus	communis	
67	——		
68	——	americanus	
472	Robinia	Pseudacacia	
494.	Rosa	alba	
495 }	——	semper virens	
496 }			
497	Rosmarinus	off:	
500	Rubia	tinctorum	
501	Rubus	fruticosus	
502	——	Idaeus	
124	Rumex	alpinus	
124	——	acetosa	
321	——	patientia	
322	——	pulcher	
323	——	sanguineus	
324	——	acutus	
326	——	crispus	
327	——	aquaticus	
503	Ruscus	Ippophyllum	
~~504~~	——	aculeatum	
505.	Ruta	graveolens	

S.

111	Saccharum	off:	
112	——		
508.	Salix	alba	
509	——	caprea	
559	Salsola	soda	
560	——	kali	
305.	Salvia	sclarea	
510	——	officinalis	
510	——	hispanica	
511	——	verbenaca	
529	——	pratensis	
512.	Sambucus	nigra	
254	——	ebulus	
513.	Samolus	valerandi	
514	Sanicula	europea	
516	Saponaria	off:	
517	Satureia	hortensis	
518	——	juliana.	
587	——	capitata	

p.
519 Saxifraga Granulata
519 —— Trydactilites
524 Scabiosa Columbaria
525 —— succisa
395 Scandix anthriscus
526 —— pecten
213 —— cerefolium
527 Scilla maritima
528 —— autumnalis
532 Scorzonera hispanica
533 Scrophularia nodosa
534 —— aquatica
581 Scutellaria galericulata
535 Secale cereale
142 Sedum Telephium
143 —— anacampseros
537 —— album
538 —— acre
539 —— reflexum
589 Selinum palustre
536 Sempervivum tectorum
311 Senecio Jacobea
540 —— vulg.
542 Serratula tinctoria
544 Sideritis hirsuta
546 Sinapis rapifolia
546 —— album
554 Sison anomum
403 Sisymbrium nasturtium
549 —— amphybium
550 —— —— v.p.
557 —— —— v.f.
553 —— sophia
169 Sium ang: folium
548 —— sisarum
555 Smilax asper
+263 Solanum Dulcamara
374 —— melongela
561 —— nigrum
562 —— Tuberosum
563 Soldanella alpina
627 Solidago Virgaurea
564 Sonchus oleraceus
565 —— —— v.p.
566 Sorbus domestica
286 Spartium Scoparium
286 —— junceum
553 + Smyrnium olusatrum

p.
228 } Spinacia oleracea
229 }
270 Spiræa Filipendula
632 —— ulmaria
281. Stachis sylvatica
282 —— palustris
569 —— Germanica
571 Statice armeria
93. Styrax ou Benjoin off.
231 Symphytum off.
574 Syringa vulg.

T

54. Tamarindus vulg.
576 Tamarix Germanica
577 —— gallica
182. Tamus vulg.
578 Tanacetum vulg.
579 —— Balsamita
580 Taxus Baccata
462 Teucrium Polium luteum
462 —— —— album
530 —— Scordium
531 —— Scorodonia
214 —— Chamaedrys
217 —— Chamaepitis
218 —— Iva
366 —— marum
583 Thalictrum flavum
44 Thè Chinensis
63 Theobroma cacao
83 —— Belzoinum
584 Thlaspi campestre
584 —— alliaceum
585 —— arvense
185 —— Bursa pastoris
367 Thymus martichina
541 —— serpyllum
588 —— vulg.
590 Tilia Europea
595 Tordylium anthriscus
596 Tormentilla erecta
597 Tragopogon porrifolium
598 —— pratense

600 Trapa natans
393 Tremella nostoch
599 Tribulus terrestris
352 Trifolium m. cerulea
370 —— m. off:
601 ~~Trigonella~~ pratense
602 ~~Triticum~~ arvense
275 Trigonella faenum-Graecum
291 Triticum repens
606 —— Hybernum
404 Tropaeolum majus
449 Tussilago Petasites
607 —— farfara

V

434 Vaccinium oxiocus
631 —— vitis idea
235 Valantia cruciata
25 Valeriana montana
25 —— celtica
26 —— pyrenaica
608 —— rubra
609 —— off:
610 —— Divica
611 —— locusta
18 Veratrum album
18 —— nigrum
613 Verbascum Thapsus
614 Verbena off:
165 Veronica anagallis
616 —— officinalis
617 —— serpylli fol:
618 —— chamaedris
619 —— spicata
426 Viburnum opulus
620 —— lantana
268 Vicia faba
621 Vicia sativa
448 Vinca major
448 —— minor
622 Viola odorata
628 Viscum album
131 Vitex agnus castus

50. Vitis vinifera
630 —— vinifera

U

633 Ulmus camp.
637 Urtica major
638 —— minor
638 —— pilulif.

X

642 Xanthium strum.

Z

369 Zea mays